

Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет біології та лісового господарства
Кафедра зоології

О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін

Прикладна ентомологія

*методичні рекомендації
до виконання лабораторних робіт*

Луцьк – 2023

*Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Волинського національного університету імені Лесі Українки
(протокол № 7 від 16 березня 2023 р.)*

Рецензенти:

Волгін С. О. – професор кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Волинського національного університету імені Лесі Українки, професор, доктор біологічних наук,
Григор'єва Н. В. – завідувач відділу природничих дисциплін Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Зінченко О. П., Сухомлін К. Б.

З 63 **Прикладна ентомологія** : метод. рек. до викон. лабораторних робіт / Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет біології та лісового господарства, кафедра зоології. Луцьк, 2023. 96 с.

Видання вміщує методичні вказівки до виконання 12 лабораторних робіт із курсу «Прикладна ентомологія», передбачених навчальним планом для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання галузі знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія», за освітньо-професійною програмою «Біологія».

У роботах розглядаються теми, що висвітлюють основні розділи курсу. До кожної лабораторної роботи наведені тема, мета, питання для контролю знань, хід виконання роботи.

УДК 576.895.771.095.6.08

Передмова

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна ентомологія» призначені для студентів освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання галузі знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія», за освітньо-професійною програмою «Біологія».

Основу видання складають 12 лабораторних робіт, які належать до двох модулів: «Загальні питання прикладної ентомології. Синантропи і та ектопаразити» (з 1 по 7 роботи) та «Гнус» (з 8 по 12 роботи). Під час виконання робіт студенти ознайомлюються з типовими представниками комах, які є паразитами, кровососами і переносниками збудників хвороб людини та тварин.

Перший змістовий модуль присвячений вивченню отруйних комах, тарганів, клопів-гематофагів, вошей та пуходів, бліх та синантропних мух. Другий змістовий модуль вміщує інформацію про основні компоненти гнусу, а саме: кровосисних комарів, мокреців, москітів, мошок та гедзів. У всіх роботах значна увага приділена вивченню морфологічних структур комах, що спрямовує здобувачів освіти на засвоєння наукової термінології. Наведені латинські назви найважливіших видів, що полегшує опанування сучасної наукової номенклатури. Студенти мають засвоїти знання про будову, цикли розвитку, місця мешкання, екологію, систематику комах кожної групи, а також відомості щодо їх медичного та ветеринарного значення.

Методичні вказівки ілюстровані численними рисунками, які дозволяють отримати уявлення про зовнішній вигляд досліджуваних об'єктів і засвоїти морфологічні характеристики, необхідні для правильного визначення небезпечних комах. Наприкінці методичних рекомендацій наведено список літератури запропонованої для поглибленого вивчення курсу та посилання на інтернет ресурси.

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕНТОМОЛОГІЇ. СИНАНТРОПИ І ТА ЕКТОПАРАЗИТИ

Лабораторна робота № 1

Тема: Огляд отруйних комах.

Мета: На прикладі отруйних комах: гусениць лускокрилих, жуків-навивників та жалячих перетинчастокрилих ознайомитися з особливостями будови та їх медичним значенням.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10» та «МБР-1», мікропрепарати отруйних волосків гусіні, мікропрепарати отруйних апаратів ос та бджіл, колекції отруйних комах, визначники, таблиці.

Контрольні питання

1. Токсикологічна характеристика отруйних комах.
2. Систематичний огляд отруйних комах.
3. Біологія жалячих перетинчастокрилих.
4. Біологія отруйних твердокрилих.
5. Біологія алергенних лускокрилих.
6. Комахи з отруйним ротовим апаратом.
7. Методи боротьби та захисту від отруйних комах.
8. Перша допомога при отруєнні комахами.

Класифікація

Ряд Лускокрилі – Lepidoptera

Родина Хвилянкові – Lymantriidae

Золотогуз – Euproctis chrysorrhoea

Родина Кокконопрядові – Lasiocampidae

Шовкопряд сосновий – Dendrolimus pini

Ряд Твердокрилі – Coleoptera

Родина Наривникові – Meloidae

Олійниця звичайна – Meloe proscarabaeus

Наривник чотирикранковий – Mylabris quadripunctata

Шпанська мушка аптекарська – Lytta vesicatoria

Шпанка червоноголова – Epicauta erythrocephala

Ряд Перетинчастокрилі – Hymenoptera

Родина Бджолині – Apidae

Бджола медоносна – Apis mellifera

Джміль земляний – Bombus terrestris

Родина Складчастокрилі оси – Vespidae

Шершень звичайний – Vespa crabro

Оса звичайна – Paravespula vulgaris

Родина Піщані оси – Crabronidae

Бджолиний вовк – Philanthus triangulum

Родина Мурашкові – Formicidae

Мураха-мірміка руда – Myrmica rubra

Хід роботи

Робота 1. Вивчення отруйного апарату личинок лускокрилих

Ознайомтеся з зовнішнім виглядом отруйної гусені золотогуза (*Euproctis chrysorrhoea*) або шовкопряда соснового (*Dendrolimus pini*). Розгляньте гусінь під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 0,6^x. Зверніть увагу на спинні горбки гусені, де залозисті клітини утворюють великі скупчення.

Зарисуйте зовнішній вигляд гусені золотогуза та соснового шовкопряда (Рис. 1).




Рис. 1. Гусінь: А – золотогуза (*Euproctis chrysorrhoea*); Б - шовкопряда соснового (*Dendrolimus pini*): 1 – отруйні волоски

Розгляньте на великому збільшенні під мікроскопом «МБР-1» препарат отруйних волосків гусені. Волоски мають форму зазублених стрілок і заглиблені гострими кінцями в резервуар отруйної клітини. У кожній клітині знаходиться від 3 до 12 волосків.

Зарисуйте схему будови отруйних волосків і залоз і позначте їх структури (Рис. 2).




Рис. 2. Схема будови отруйних волосків гусені золотогогуза:

1 – отруйний волосок, 2 – кінчик волоска, що надламується, 3 – клітина, що утворює отруту, 4 – внутрішньоклітинні отруйні канали, 5 – гіподерма, 6 – сосочок, 7 – ендутикула, 8 – базальна мембрана, 9 – трихогенна клітина

Робота 2. Визначення отруйних жуків

Ознайомтесь з колекцією отруйних жуків місцевої фауни. Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 0,6^x представників родини Наривникові з родів: *Meloe*, *Mylabris*, *Lytta*, *Episcauta*.

Визначте представників цієї групи. Зарисуйте зовнішній вигляд жуків з дорзальної сторони (Рис. 3).




Рис. 3. Представники отруйних жуків: А – олійниця звичайна (*Meloe proscarabaeus*); Б – наривник плямистий (*Mylabris calida*); В – шпанська мушка аптекарська (*Lytta vesicatoria*); Г – червоноголова шпанка (*Epicauta erythrocephala*)

Робота 3. Визначення отруйних перетинчастокрилих

Ознайомтесь з колекцією отруйних перетинчастокрилих. Розгляньте комах під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $0,6^x$. Визначте види отруйних перетинчастокрилих з надродин осоподібні (родина складчастокрилі оси), бджолині (бджоли і джмелі) та мурашині (мурашки р. *Myrmica*).

Зарисуйте їх зовнішній вигляд з дорзальної сторони (Рис. 4).




Рис. 4. Представники отруйних видів перетинчастокрилих:

А – шершень звичайний (*Vespa crabro*); Б – Бджолиний вовк (*Philanthus triangulum*); В – мураха-мірміка руда (*Myrmica rubra*); Г – джміль земляний (*Bombus terrestris*)

Робота 4. Вивчення жалячого апарату перетинчастокрилих

Розгляньте на великому збільшенні під мікроскопом «МБР-10» препарат жалячого апарату оси.

Зарисуйте і позначте деталі будови жалячого апарату оси (Рис. 5).




Рис. 5. Будова жалячого апарату оси: 1 – трикутна пластинка, 2 – дуга колючої щетинки, 3 – дуга санчат, 4 – довгаста пластинка, 5 – стилет санчат, 6 – третя пластинка, 7 – квадратна пластинка

Лабораторна робота 2

Тема: Особливості будови, біологія і екологія тарганів.

Мета: На прикладі прусака, чорного, американського, гігантського та мадагаскарського тарганів ознайомитися з особливостями будови та розвитку тарганів.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати ротових апаратів таргана чорного, тотальні мікропрепарати личинок тарганів, оотеки тарганів, колекції тарганів, визначники, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика ряду таргани та їх систематичний огляд.
2. Зовнішня будова тарганів.
3. Анатомічна будова тарганів.
4. Особливості розвитку і розмноження тарганів.
5. Біологія тарганів.
6. Таргани – переносники збудників інфекційних та інвазійних захворювань.
7. Боротьба з тарганами.

Класифікація

Ряд Тарганові – Blattoptera

Тарган чорний – *Blatta orientalis*

Тарган рудий, або прусак – *Blattella germanica*

Тарган лісовий – *Ectobius sylvestris*

Тарган-перипланета американський – *Periplaneta americana*

Тарган мадагаскарський – *Gromphadorhina portentosa*

Тарган гігантський – *Blaberus giganteus*

Тарган середньоазійський – *Shelfordella tartara*

Тарган-черепашка соссюра – *Polyphaga saussurei*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови таргана чорного

Розгляньте самця та самку таргана чорного (*Blatta orientalis*) (Рис. 1). Вони мають великі розміри. Довжина самця коливається в межах 20-25 мм, самки – 18-30 мм. Голова таргана – гіпогнатичного типу з направленими донизу ротовими придатками, сильно сплюснена в передньо-задньому напрямку. Вона рухомо прикріплена до передньогрудей і зверху частково прикрита передньоспинкою.




Рис. 1. Тарган чорний (*Blatta orientalis*), вигляд зверху:

А – самець, Б – самка: 1 – голова, 2 – нижньощелепний щупик, 3 – око, 4 – вусики, 5 – передньоспинка, 6 – середньоспинка, 7 – щиток, 8 – задньоспинка, 9 – надкрила, 10 – передня нога, 11 – середня нога, 12 – задня нога, 13 – черевце, 14 – церки, 15 – грифельки

Зверніть увагу на статевий диморфізм у цього виду. Надкрила самки одноколірні, маленькі, не виступають за задній кінець задньоспинки. Крила практично відсутні. Надкрила самців не доходять до вершини черевця, прикривають одне одного, досить широкі. Крила дорівнюють довжині надкрил. Генітальна пластинка самця з двома грифельками.

Зарисуйте загальний вигляд самця і самки таргана чорного із спинної сторони (Рис. 1). Позначте основні структури зовнішньої будови.

Робота 2. Вивчення будови ротового апарату таргана чорного

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x ротові органи таргана чорного.




Рис. 2. Ротовий апарат таргана чорного: А – верхня губа; Б – верхні щелепи; В – нижні щелепи: 1 – основний членик, 2 – стебельце, 3 - нижньощелепний щупик, 4 – зовнішня жувальна лопать, 5 – внутрішня жувальна лопать; Г – нижня губа: 6 – додаткові язички, 7 – язички, 8 – нижньогубні щупики, 9 – підборіддя, 10 – підпідборіддя

Ротовий апарат таргана гризучого типу. Він складається з рухомої непарної верхньої губи (labrum), пари непочленованих верхніх щелеп (mandibulae) з тупими масивними зубцями, пари нижніх щелеп (maxillae) та нижньої губи (labium). Нижня щелепа почленована, поділяється на проксимальну частину – основний членик (cardo), дистальну частину – стебельце (stipes) і пару жувальних лопатей – зовнішню (galea) та внутрішню

(lacinia). Стебельце має щелепний щупик (palpus maxillaris), який складається з 5 члеників. Нижня губа також почленована. Вона складається з підпідборіддя (submentum), підборіддя (mentum) та нижньогубних щупиків (palpi labiales). Знизу на підборідді є дві пари термінальних придатків: внутрішні лопаті – язички (glossae) і зовнішні лопаті – придаткові язички (paraglossae).

Зарисуйте ротові органи таргана чорного і позначте їх структури (Рис. 2).

Робота 3. Вивчення кінцівок тарганів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x задню кінцівку таргана чорного. Вона належить до бігального типу. Тазик (соха) сильно розвинений, довгий широкий та сплющений. За ним розташована маленька коротка овороть або вертлюг (trochanter), що нерухомо з'єднана з більш тонким стегном (femur). Гомілка (tibia) вкрита численними шипами. Лапка (tarsus) – п'ятичленикова, її перший членик значно довший, ніж інші членики. На дистальному членику лапки є 2 кігтики з присоском (pulvillum) між ними.

Зарисуйте кінцівку таргана чорного і позначте її структури (Рис. 3).




Рис. 3. Задня кінцівка чорного таргана: 1 – тазик, 2 – овороть, 3 – стегно, 4 – колінний шип, 5 – гомілка, 6 – лапка, 7 – кігтики, 8 – присосок

Робота 4. Вивчення зовнішньої будови личинок тарганів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинок прусака та таргана чорного (Рис. 4).




Рис. 4. Личинки тарганів, вигляд зверху: А – прусак, Б – тарган чорний

Вони подібні до імаго, але менші за розмірами. Личинки молодшого віку без крил; у личинок старшого віку крила зачаткові й мають вигляд пластинок, що лежать з боків середньо- і задньоспинки. Крім того, морфологічні відмінності між личинками різного віку полягають у кількості члеників вусиків і церок, а також у ступені розвитку 8-го і 9-го стернітів черевця та у наявності й розмірах грифельків на останньому з них.

Зарисуйте загальний вигляд личинок рудого та чорного тарганів із спинної сторони (Рис. 4).

Робота 5. Вивчення оотек тарганів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x оотеки рудого і чорного тарганів.

Оотека прусака завдовжки 9 мм, завширшки 3 мм. На її поверхні помітні вдавлювання між яйцями, що надають їй гофрованого вигляду.

Оотека чорного таргана завдовжки 12 мм і завширшки 6 мм, її передній та задній кінці заокруглені, верхній край виступає у вигляді кіля.

Зарисуйте зовнішній вигляд оотек рудого та чорного тарганів (Рис. 5).




Рис 5. Оотеки: А – рудого таргана, Б – чорного таргана

Робота 6. Вивчення видової різноманітності тарганів і їх визначення

Ознайомтеся з колекцією тарганів. Визначте окремі види тарганів: прусака, американського, мадагаскарського та гігантського таргана (Рис. 6).




Рис 6. Таргани: А – тарган рудий, Б – тарган американський, В – тарган мадагаскарський, Г – тарган гігантський

Тарган рудий, або прусак має червонувато-жовтий чи рудий колір. Довжина 11–13 мм. Крила є у обох статей. Самець має лише лівий грифельок.

Тарган-перипланета американський має довжину близько 30 мм. Крила є у обох статей. Тіло каштаново-коричневого кольору з жовтими плямами на передньоспинці.

Тарган мадагаскарський завдовжки 70–75 мм. Забарвлення тіла коричневе, задні грудні сегменти и передньоспинка коричнево-чорні. Крила відсутні. Самців легко відрізнити від самок за наявністю двох горбоподібних ріжків на передньою грудях.

Тарган гігантський має довжину до 90–100 мм, світло-коричневого кольору, частина передньоспинки чорна. Крила мають обидві статі.

Розгляньте деталі будови тарганів під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» на різних збільшеннях.

Зарисуйте зовнішній вигляд тарганів, які були запропоновані для розгляду (Рис. 6).

Лабораторна робота 3

Тема: Особливості морфології і біології кровосисних клопів.

Мета: На прикладі постільної блощиці та тріатомових клопів ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати ротових органів, яєць постільної блощиці та тотальні мікропрепарати самців, самок і личинок постільних клопів, визначники, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика ряду напівтвердокрили.
2. Систематичний огляд кровосисних клопів, представники.
3. Морфологія паразитичних клопів.
4. Особливості розвитку і розмноження постільної блощиці.
5. Клопи – паразити людини і тварин.
6. Медичне значення тріатомових клопів та постільної блощиці.

Класифікація

Ряд Клопи, або Напівтвердокрили – Hemiptera

Клоп постільний, блощиця ліжкова – *Cimex lectularius*

Клоп тропічний – *Cimex hemipterus*

Клоп голубиний – *Cimex columbarius*

Клоп ластів'ячий – *Oeciatius hirundinus*

Клоп поцілунковий – *Triatoma sanguisuga*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови імаго постільної блощиці (*Cimex lectularius*)

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x і 2^x фіксованих самок і самців постільної блощиці та їх тотальні мікропрепарати.

Клопів орієнтують головою вперед і розглядають зі спинної сторони (Рис. 1). Оскільки тіло комахи не розміщується повністю в полі зору, то спочатку помістить у центр голову і груди.

Зарисуйте загальний вигляд голови та грудей постільної блощиці з спинної сторони.




Рис. 1. Постільна блощиця (*Cimex lectularius*): А – зовнішній вигляд зверху, Б – голова і груди (середнє збільшення)

Робота 2. Вивчення будови ротового апарату постільної блощиці

Розгляньте мікропрепарат голови дорослої постільної блощиці з відігнутиим хоботком під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні (Рис. 2).




Рис. 2. Голова постільної блощиці: 1 – верхня губа, 2 – верхня щелепа, 3 – нижня щелепа, 4 – нижня губа, 5 – вусики

Ротовий апарат клопа належить до колючо-сисного типу. Перед лицем помітна напівовальна хітинова пластинка – верхня губа. При нормальному положенні вона підігнута і прикриває основу ротового апарату. Під верхньою губою розташована вкрита з країв волосками вузька довга тричленикова пластинка – нижня губа. Вздовж нижньої губи тягнеться жолобок, у якому вкладені чотири тонких, довгих і гострих щетинки. Колючі щетинки – це видозмінені верхні і нижні щелепи. При виготовленні препарату вони зазвичай

виходять з хоботка і розміщуються вздовж губи. Нижньощелепні і нижньогубні щупики у блощиць редуковані.

Зарисуйте голову постільної блощиці. Позначте: верхню губу, верхні щелепи, нижні щелепи, нижню губу, вусики (Рис. 2).

Робота 3. Вивчення будови черевця самців і самок постільної блощиці

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x кінець черевця самок і самців постільної блощиці. Самки мають широке, заокруглене черевце; самці – більш стиснуте, видовжене. Зверніть увагу, що кінець черевця самця асиметричний. Останній сегмент з одного боку немовби вирізаний: з цієї сторони до нього прилягає серпоподібний вигнутий копулятивний апарат.

Самка відрізняється від самця будовою останнього сегменту черевця. Кінець черевця самки симетричний, заокруглений, має вигляд невеликого світлого виступу з анальним отвором, який знаходиться на середині сегменту. Над ним розміщується статевий отвір у вигляді невеликої поздовжньої щілини (на середній лінії тіла), оторочений видовженими пластинками. Світлі цяточки на краях черевних сегментів – дихальця, або стигми.

Розгляньте і зарисуйте загальний вигляд черевця самця і самки постільної блощиці з черевного боку (Рис. 3).




Рис. 3. Кінець черевця постільної блощиці: А – самець, Б – самка

Робота 4. Вивчення будови яйця постільної блощиці

Розгляньте мікропрепарат яйця постільної блощиці під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні. Яйце овальне, з тонким верхнім полюсом і більш товстим нижнім. На верхівці яйце пересікає поперечна смужка – нижня

межа яйцевої кришечки. На нижньому кінці яйця помітно клейову масу, якою яйце прикріплюється до різних предметів (Рис. 4).

Зарисуйте яйце постільної блощиці і позначте його кришечку.



Рис. 4. Яйце постільної блощиці: 1 – кришечка, 2 - клейова маса

Робота 5. Вивчення зовнішньої будови личинки постільної блощиці 1-го віку

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» зовнішній вигляд личинки постільної блощиці 1-го віку (Рис. 5). При малому збільшенні мікроскопу личинка цілком розміщується у полі зору. Зорієнтуйте її головою вперед. Дві червоні плями з країв голови – очі, перед ними 4-членикові вусики, між ними лице, від якого підгинається під голову хоботок представлений вузькою, видовженою пластинкою, яка сягає рівня передньої пари ніг. Хоботок легко помітити, фокусуючи зображення за допомогою макрогвинта мікроскопу. За головою знаходяться поперечні пластинки – верхні півкільця сегментів тіла вкриті дрібними волосками. Перші три – грудні сегменти, інші – черевні. На відміну від дорослих клопів у личинок другий грудний сегмент рудиментів крил не має. У всіх личинок черевце округле. На його кінці знаходиться анальний отвір.

Змінюючи мале збільшення на велике, розмістіть черевце у центрі поля зору. По середній лінії тіла, вздовж заднього краю III-V сегментів, помітні невеликі поперечні щілини – отвори пахучих залоз. Лапки складаються з двох члеників, а не з трьох як у дорослого клопа.

Зарисуйте зовнішній вигляд личинки клопа (*Cimex lectularius*) 1-го віку і позначте отвори пахучих залоз.




Рис. 5. Личинка постільної блощиці 1-го віку: 1 – отвори пахучих залоз

Робота 6. Вивчення зовнішньої будови поцілункового клопа

Розгляньте на таблиці зовнішню будову поцілункового клопа р. *Triatoma*.

Поцілункові клопи – великі комахи завдовжки близько 35 мм, з яскравим строкатим забарвленням (Рис. 6). Мають видовжену голову гіпогнатичного типу з довгими тонкими вусиками, розвинутими очами і дзьобоподібним хоботком. Крила добре розвинуті і мають відносно просте жилкування. Церки відсутні.

Зарисуйте зовнішню будову поцілункового клопа із спинного боку.




Рис. 6. Зовнішня будова поцілункового клопа *Triatoma infestans*

Лабораторна робота 4

Тема: Особливості морфології і біології вошей та пухоїдів.

Мета: На прикладі людських та свинячих вошей, пухоїдів та волосоїдів ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати гнид та тотальні мікропрепарати вошей і пухоїдів, визначники, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика ряду воші.
2. Класифікація вошей, представники.
3. Морфологія вошей.
4. Біологія вошей і приуроченість їх до живителів.
5. Особливості розвитку і розмноження вошей.
6. Воші паразити людини і боротьба з ними.
7. Воші переносники інфекційних хвороб.
8. Воші і епідемічний висипний тиф.
9. Боротьба з педикульозом та фтіріозом.
10. Загальна характеристика ряду пухоїдів.
11. Морфологія пухоїдів.
12. Класифікація пухоїдів, представники.
13. Біологія пухоїдів.
14. Залежність біології пухоїдів від біології їх хазяїв.
15. Вплив линяння і міграцій хазяїна на пухоїдів.
16. Патогенність пухоїдів і боротьба з малофагозами.

Класифікація

Ряд Воші – Anoplura

Родина Педикулідові, або Людські воші – Pediculidae

Воша людська – *Pediculus humanus*

Воша людська головна – *Pediculus humanus capitis*

Воша людська одяжна – *Pediculus humanus humanus*

Воша лобкова, або плочиця – *Phthirus pubis*

Родина Гематопідові, або Незрячі воші – Haematopidae

Воша свиняча – *Haematopinus suis*

Воша кінська – *Haematopinus asini*

Воша теляча – *Linognathus vituli*

Воша собача – *Linognathus setosus*

Ряд Пухоїди – Mallophaga

Підряд Amblicera

Родина Пухоїди – Menoponidae

Пухоїд курячий – *Menopon gallinae*

Родина Пероїди – Philopteridae

Пероїд тонкочеревий – *Lipeurus caponis*

Підряд Ischnocera

Родина Волосоїди – Trichodectidae

Волосоїд бичачий – *Bovicola bovis*

Волосоїд собачий – *Trichodectes canis*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови воші людської (*Pediculus humanus*)

Розгляньте при малому збільшенні мікроскопу тотальний препарат імаго воші людської зі спинного боку. Самка завдовжки 2-4 мм, самець – 2-3 мм (Рис. 1).




Рис. 1. Людська воша головна (*Pediculus humanus capitis*), загальний вигляд зверху: А – самець, Б – самка

Зорієнтуйте комаху головою вперед. Голова чітко відокремлена від грудей. Черевце починається позаду від 3 пари ніг. Голова розширена у середній частині, де розташовані прості вічка. Попереду від них розташовані п'ятичленикові вусики; вони відносно короткі й товсті. Передня частина голови між основою вусиків та вічками називається лоб, а задня, вузька частина – потилиця. На передньому краї голови є невеличке підвищення – рот. Ротових частин не помітно, вони втягнуті всередину голови і містяться в особливому футлярі. Груді злиті, трапецієподібні, трохи опуклі з боків. Знизу під грудьми помітно 3 пари чіпких ніг. Крила відсутні. Черевце трохи ширше, ніж груді, має фестончасті краї. З боків тіла можна побачити 1 пару середньогрудних і 6 пар черевних дихалець. На поверхні хітину помітні

волоски, розташовані у декілька рядів. VIII сегмент черевця розщеплений; на ньому термінально відкривається анальний отвір.

З черевного боку розгляньте прикріплення ніг до грудей. На черевці знизу знайдіть поперечні ряди волосків. На передостанньому сегменті помітна п'ятикутна пігментна пляма. Позаду від неї лежить пара серпоподібно вигнутих придатків, які називаються гоноподами. Їхні краї вкриті волосками. Між основами гонопод знаходиться статевий отвір. Гоноподами воша охоплює волосся або нитку тканини, на яку відкладає яйце.

Зарисуйте загальний вигляд самця і самки воші людської головної (Рис. 1).

Робота 2. Вивчення зовнішньої будови воші лобкової (*Phthirus pubis*)

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x і 2^x імаго лобкової воші. Тіло лобкової воші плескате, широке і коротке. Голова має форму видовженого прямокутника, відносно велика, широкою основою прикріплюється до грудей. Груді і черевце майже не відмежовані. Черевце має чотири пари бородавчастих виростів із довгими щетинками. Ноги площіці збільшуються у розмірах від першої до третьої пари. Самець завдовжки 1 мм, самка – 1,5 мм.

Зарисуйте загальний вигляд лобкової воші (Рис. 2).




Рис. 2. Самка лобкової воші (*Phthirus pubis*), загальний вигляд зверху

Робота 3. Вивчення зовнішньої будови воші свинячої (*Haematopinus suis*)

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $0,6^x$ і 1^x імаго воші свинячої (Рис. 3). Тіло воші жовтого або сіро-коричневого кольору з темною смугою з боків. Голова видовжена і відносно вузька. Груді помітно коротші,

ніж голова, трапецієподібні, їх максимальна ширина дорівнює довжині. Ноги довгі, масивні, бурого або чорнуватого забарвлення.

Черевце широке, овальне має міжсегментні виїмки. З боків грудей і черевця є добре помітні дихальні отвори – стигми. Довжина тіла самки 4,2–5 мм, самця 3,6–4,2 мм.

Зарисуйте загальний вигляд імаго воші свинячої. Позначте структури зовнішньої будови.




Рис. 3. Воша свиняча (*Haematopinus suis*), загальний вигляд: 1 – голова, 2 – груди, 3 – черевце, 4 – вусик, 5 – око, 6 – передня нога, 7 – середня нога, 8 – задня нога, 9 – середньогрудне дихальце, 10 – черевне дихальце

Робота 4. Вивчення будови голови воші свинячої (*Haematopinus suis*)

Розгляньте під мікроскопом на малому збільшенні голову воші свинячої. Голова прогнатична, шестикутна, звужена спереду (Рис. 4). Дорзально на ній виділяють верхню губу у вигляді невеличкої пластинки, лице, лоб, тім'я і потилицю. З боків середньої частини голови виступають 5-членикові, ниткоподібні короткі вусики. Редуковані очі, розміщуються за вусиками з боків. Ротовий отвір знаходиться на невеликій термінальній кільцевій складці, що може вивертатись і вип'ячуватись у вигляді короткого ротового конусу, несе віночок хітинових гачків для прикріплення. Ротовий апарат колючо-сисного типу розташований усередині голови в особливому трубчастому вп'ячуванні нижньої стінки ротової порожнини.

Зарисуйте голову воші свинячої. Позначте структури зовнішньої будови.




Рис. 4. Голова самки свинячої воші (*Haematopinus suis*) зверху: 1 – ротовий конус; 2 – верхня губа; 3 – лице; 4 – око; 5 – лоб; 6 – тім'я; 7 – тім'яний шов; 8 – потилиця; 9 – постфронтальний шов; 10 – клипеофронтальний шов; 11 – вусик

Робота 5. Вивчення будови кінцівки воші свинячої (*Haematopinus suis*)

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» кінцівку воші при збільшенні 4^x. Останній членок ніжки має сильно розвинений кігтик, який разом з виростом передостаннього членка утворює ніби клешню (Рис. 5), тому нога міцно тримається на волоссі. Гомілка на дистальному кінці розширена і має пальцеподібний виступ і передтарзальний придаток. Лапка закінчується кігтиком і тарзальними пульвілами.

Зарисуйте чітку кінцівку воші свинячої. Позначте її структури.




Рис. 5. Права передня нога самки свинячої воші: 1 – кігтик, 2 – лапка, 3 – гомілка, 4 – стегно, 5 – овороть, 6 – тазик, 7 – пальцеподібний виступ, 8 – передтарзальний придаток, 9 – тарзальні пульвіли

Робота 6. Вивчення будови яєць різних видів людських вошей

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x зовнішній вигляд яєць (гнид) людських вошей: головної, одяжної та площинної.

Вони мають овальну форму та біле блискуче забарвлення. Гниди прикріплені прозорою клейкою масою до волосся чи ниток тканини. Вільний

полюс яйця закритий кришечкою, на якій помітні тісно зближені комірочки (Рис. 6).

Гнида площинці має грушоподібну форму, її опукла кришечка з високими комірками. Довжина 0,65–0,67 мм. Приклеєна до однієї волосини. Гнида головної воші має овальну форму і слабо опуклу кришечку з комірками середньої величини. Довжина 0,75–0,8 мм. Приклеєна до однієї волосини. Гнида одержної воші овальної форми, має на плоскій кришці низькі комірочки і прикріплена до перехрестя ниток або волосся. Довжина 0,9–1,0 мм.

Зарисуйте гниди площинці, головної та одержної воші. Позначте кришечки та секрети клейових залоз.




Рис. 6. Гниди людських вошей: А – одержної воші; Б – головної воші; В – лобкової воші: 1 – кришечка, 2 – цементуюча речовина

Робота 7. Вивчення зовнішньої будови пухоїдів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x імаго представника підряду *Amblicera* – пухоїда курячого (*Menopon gallinae*). Його тіло має блідо-жовтий колір. Помітний чіткий поділ на 3 частини: голову, груди та черевце (Рис. 7.А). Голова трикутна, її ширина більша, ніж довжина, найбільшу ширину вона має поблизу заднього краю. На голові помітні нижньощелепні щупики. Вусики короткі, булавоподібні і вкладаються у спеціальні ямки. Орбітальні синуси майже повністю зайняті редукованими фасетковими очима, що мають по два оматидія. Ротовий апарат гризучого типу, розташований на нижній стороні голови. Передньогруди сильно звужені спереду, їх задній край дугоподібно заокруглений; середньогруди частково редуковані, але виразні; задньогруди лише трохи ширші, ніж голова. Ноги

добре розвинуті, бігального типу, мають два кігтики. Черевце видовжене, конусоподібно звужене ззаду, з виразними міжсегментними швами; тергіти і стерніти з широкою поперечною плямою, тергіти з одним рядом щетинок вздовж заднього краю; бічні краї сегментів з декількома міцними щетинками. Довжина 1,8–2,0 мм.




Рис. 7. Загальний вигляд пухоїдів: А – пухоїд курячий (*Menopon gallinae*): 1 – лоб, 2 – око, 3 – тім'я, 4 – нижньощелепний щупик, 5 – вусик, 6 – грудні сегменти, 7 – черевце; Б – Волосоїд собачий *Trichodectes canis*; загальний вигляд

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x також волосоїда собачого (*Trichodectes canis*) – представника підряду Ischnocera (Рис. 7.Б). Тіло волосоїда має жовтий колір, чітко поділяється на 3 частини: голову, груди та черевце. Груді – найвужча частина тіла, голова значно ширша, ніж груди, черевце – ширше, ніж голова. Голова має форму широкого прямокутника з переднім опуклим краєм. З боків на ній помітні довгі ниткоподібні вусики. Нижньощелепні щупики і очі відсутні. Майже посередині голови помітні вигнуті щелепи.

Груді майже трапецієподібні з міжсегментними виїмками з боків. Ноги чіпкого типу з одним кігтиком, вкриті волосками. Черевце овальне, широке, з чіткими границями сегментів та рядами довгих щетинок. Довжина тіла 1,8-2,0 мм.

Зарисуйте загальний вигляд пухойда курячого та волосойда собачого. Позначте у пухойда курячого структури зовнішньої будови.

Робота 9. Вивчення кінцівок пухойдів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x чіпкі кінцівки пухойдів та волосойдів. Лапки пухойдів, що паразитують на птахих, мають 2 кігтики, а волосойдів – паразитів ссавців лише 1 кігтик (Рис. 8). Зверніть увагу на подібність будови кігтиків волосойдів з кігтикам вошей.

Зарисуйте термінальні частини лапок пухойдів та волосойдів. Позначте структури їх зовнішньої будови.




Рис. 8. Кінцівки Mallophaga: А – пухойда, Б – волосойда: 1 – кігтик, 2 – лапка, 3 – гомілка
– гомілка

Лабораторна робота 5

Тема: Особливості морфології і біології бліх

Мета: На прикладі людської, котячої, собачої та пацюкової бліх ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати ротових апаратів і кінцівок бліх, тотальні мікропрепарати імаго та личинок бліх, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика ряду блохи.
2. Систематичний огляд бліх, представники.
3. Морфологія бліх.
4. Біологія бліх і приуроченість їх до живителів.
5. Особливості розвитку і розмноження бліх.
6. Патогенність бліх.
7. Блохи – переносники збудників інфекційних хвороб.
8. Епідеміологічне значення бліх.

Класифікація

Ряд Блохи – Siphonaptera

Родина Пуліцидові – Pulicidae

Блоха людська – *Pulex irritans*

Блоха свійської птиці – *Echidnophaga gallinacea*

Блоха південна пацюкова, ксенопсил пацюковий – *Xenopsylla cheopis*

Блоха котяча, ктеноцефал котячий – *Ctenocephalides felis*

Блоха собача, ктеноцефал собачий – *Ctenocephalides canis*

Родина Цератофілідові – Ceratophyllidae

Блоха куряча, цератофіл пташиний – *Ceratophyllus gallinae*

Блоха ховрахова, цератофіл ховраховий – *Ceratophyllus tesquorum*

Цератофіл пацюковий – *Ceratophyllus fasciatus*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови блохи людської

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x імаго блохи людської.

Тіло блохи стиснуте з боків, вкрите щільним хітином, червоно-коричневого, іноді майже чорного кольору (Рис. 1). На препараті воно завжди лежить боком. Тіло блохи поділяється на голову, груди і черевце. Вусики, сховані у вусикових ямках голови. Дрібні волоски і шипики притиснуті до тіла і спрямовані назад, забезпечують бросі можливість легкого і швидкого пересування у волоссі хазяїна. Груді з трьох сегментів і несуть три пари стрибальних ніг. Задня пара – найбільш видовжена. Черевце складається з десяти сегментів. Три останніх оточують статевий і анальний отвори. На боках черевця, поблизу місця з'єднання тергітів і стернітів, розташовано 8 світлих крапочок – це дихальця, або стигми. На спинній стороні дев'ятого сегменту знаходиться решітчаста пластинка – пігідій, особливий орган чуття, овальний хитинізований утвір з великим числом маленьких круглих світлих комірок і дрібних чутливих волосків. Десятий сегмент черевця називається анальним, дев'ятий – переданальним.




Рис. 1. Блоха людська (*Pulex irritans*), самець: 1 – голова; 2 – око, 3 – вусик, 4 – груди; 5 – пігідій; 6 – копулятивний орган; 7 – черевце; 8 – ноги; 9 – нижньощелепний щупик

У самки черевце закінчується двома членистими придатками – церками. Тергіти і стерніти черевних сегментів черепацеподібно покривають один одного. Поблизу заднього кінця тіла помітно задній край сьомого стерніта, який у блохи людської має вирізку. У самців в кінці черевця просвічують хітинові структури копулятивного апарату – статевої клешні у вигляді видовжених і спіралеподібно закріплених утворів, у самок – сперматеки у вигляді міхурця з придатком різноманітної форми.

Зарисуйте загальний вигляд блохи людської збоку. Позначте відділи тіла і структури зовнішньої будови.

Робота 2. Вивчення будови ротового апарату блохи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x і 4^x ротовий апарат блохи людської. Ротовий апарат бліх колючо-сисного типу, обернений вниз (Рис. 2). Зверніть увагу на нижні щелепи – досить широкі плоскі пластинки з гострим краєм. Попереду від них помітні парні чотиричленикові нижньощелепні щупики. Не слід їх плутати з вусиками блохи. Верхні щелепи – вузькі, видовжені, парні пластинки з зазубленими реберцями. Між ними тягнеться непарна пластинка з гладкими краями і жолобком уздовж задньої стінки – верхня губа. Видовжена нижня губа на кінці роздвоєна, з глибоким

жолобком посередині і нижньогубними щупиками, що прилягають до її зовнішніх країв. Нижньогубні щупики складаються з чотирьох члеників.

Зарисуйте ротовий апарат блохи збоку і спереду. Позначте структури ротового апарату.




Рис. 2. Блоха людська (*Pulex irritans*), голова з ротовими органами: А – вигляд збоку, Б – вигляд спереду: 1 – верхня губа; 2 – мандибула; 3 – нижня губа; 4 – нижньогубні щупики; 5 – максилі; 6 – нижньощелепні щупики

Робота 3. Вивчення будови голови та грудей різних видів бліх

Розгляньте під мікроскопом «МБС–10» при збільшенні 2^x і 4^x голову та груди імаго декількох видів бліх: собачої, котячої, пацюкової.

Передня частина голів опукла і округла. Нею блохи розсувають шерсть або пір'я під час руху на тілі хазяїна. З боків голови знайдіть просте око – чорний, округлий утвір. Позаду ока знаходиться вусикова ямка з вусиком, що складається з двох члеників і булави. У блохи людської перший членик грушоподібний, другий кільцеподібний. У різних видів бліх форма цих члеників змінюється. Булаву вусика легко помітити позаду ока. Вусикова ямка ділить голову на передню і задню частини. Передня частина голови до місця прикріплення вусиків називається лобом. Верхня поверхня задньої частини голови називається тім'я. Борозенка, що сполучає вусикові ямки, проходить між лобом і тім'ям. Нижньобічна поверхня від лоба до ямки вусиків – щочний край. У *Pulex irritans* край лоба гладенький (Рис. 3). У інших бліх тут може знаходитися лобний зубчик.




Рис. 3. Голова та груди самок бліх: А – блоха людська (*Pulex irritans*), Б – блоха пацюкова (*Xenopsylla cheopis*): 1 – око; 2 – очна щетинка; 3 – проплевра; 4 – мезоплевра; 5 – хітинова перетинка мезоплеври; 6 – метаепістерн; 7 – метаепімер; 8 – стигма першого тергіта черевця; 9 – тергіт передньогрудей; 10 – вусик

На голові бліх є різне число щетинок. У передній частині голови перший від ока ряд щетинок називається очним. Щетинка цього ряду, що знаходиться біля ока, називається очною, а нижня максиллярною. У *Pulex irritans* ці дві щетинки і складають очний ряд. Їх розглядають при великому збільшенні. Очна щетинка *Pulex irritans* лежить перед оком і нижче від нього. У інших видів число щетинок цього ряду може бути більшим, а очна щетинка може займати інше положення. Так, наприклад, у *Xenopsylla cheopis* очний ряд складається з трьох щетинок і очна щетинка знаходиться перед оком, на його рівні (Рис. 3). Попереду від очного ряду лежить майже вертикально лобний, або фронтальний, ряд щетинок, перед якими може бути ще передфронтальний. Задня частина голови несе перший і другий ряд тім'яних щетинок; іноді вони відсутні, як, наприклад, у *Pulex irritans*.

Зарисуйте вигляд збоку голів та передньогрудей людської і пацюкової бліх (Рис. 3). Позначте структури зовнішньої будови.

У деяких видів на голові уздовж бічного краю знаходяться широкі плоскі зубці, які утворюють гребені-ктенідії. Вони помітні при малому збільшенні на голові собачої, а також котячої бліх. Зубці, які розташовані вздовж краю голови, починаючи від лобу, складають ротові ктенідії (собача і котяча блохи); якщо ж

вони розміщуються вздовж нижнього краю голови, тільки під оком, то утворюють щочні ктенідії. Очний ктенідій складається із зубців, що лежать удовж вусикової ямки. Порівняйте довжину голів і довжину фронтальних зубців головного ктенідія собачої і котячої бліх (Рис. 4). У *Stenoccephalides canis* довжина голови в 1,5 раза більша, ніж ширина. Перший фронтальний зубець головного ктенідія коротший, ніж другий, а у *Stenoccephalides felis* довжина голови в 2 рази більша, ніж ширина. Перший фронтальний зубець ктенідія дорівнює довжині другого.




Рис. 4. Голова та передньогруди бліх: А – собача блоха (*Stenoccephalides canis*); Б – котяча блоха (*Stenoccephalides felis*): 1 – ротовий ктенідій, 2 – передньогрудний ктенідій, 3 – фронтальний зубець головного ктенідія

Зарисуйте вигляд збоку голів та передньогрудей собачої і котячої бліх (Рис. 4). Позначте ктенідії та фронтальні зубці головного ктенідія.

Робота 4. Вивчення будови кінцівки блохи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» задню ногу блохи на збільшенні 4^x і 7^x або на малому збільшенні мікроскопу «МБР-1». Вона складається з тазика, вертлюга, стегна, гомілки і лапки (Рис. 5). Ця кінцівка – стрибального типу і має найдовші розміри. На препараті помітно, що тазик – найширший і видовжений членок, вкритий шипиками та щетинками. На внутрішньому боці тазика розташовані косі ряди шипиків. Оворот маленька і розташована між тазиком і стегном. Стегно витягнуте і розширене. Гомілка – видовжена і вузька. На її задньому краї є гребінь, який утворюють довгі попарно розташовані шпори. Лапка 5-членикова. На останньому членку лапки є 2

кігтики. З боків наявні 4 пари товстих щетинок. Над кігтиками, помітні шипики підошви. Крім того, лапка вкрита тонкими довгими щетинками.




Рис. 5. Задня нога блохи: А – членики кінцівки: 1 – тазик, 2 – вертлюг, 3 – стегно, 4 – гомілка, 5 – лапка; 6 – кігтики; Б – останній членник лапки: 7 – щетинки, 8 – кігтик; 9 – підошвені шипики

Зарисуйте вигляд задньої кінцівки і дистальної частини лапки блохи. Позначте членики кінцівки, і окремо на лапі – кігтики і щетинки, на підошві – шипики.

Робота 6. Вивчення будови личинки блохи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинку блохи. Личинка (Рис. 6) має видовжену, червоподібну форму. Упоперек тіла помітні більш-менш паралельні смужки – межі сегментів, покритих на спині, череві і боках волосками. Волоски передніх сегментів коротші, ніж задніх. Головний кінець личинки округлий, задній – тупий, із парою довгих виростів. Три сегменти, розташовані за головою, утворюють груди; останні 10 – черевце. Черевна сторона грудних сегментів трохи опукла, має горбки для повзання. Ноги відсутні. На останньому сегменті черевця є шкірясті виступи – анальні підпорки, або відштовхувачі.




Рис. 6. Личинка блохи: 1 – вусик, 2 – голова, 3 – груди, 4 – черевце, 5 – відштовхувач

При розгляді голови (на великому збільшенні) помітні 2 циліндричних вусики. Личинка має гризучий ротовий апарат. На передньому кінці голови є невелике заглиблення, що веде до ротового отвору. Над ним лежать витягнуті і зігнуті темні хітинові верхні щелепи, уздовж внутрішнього краю яких розташовані зубці. Членисті пластинки, що лежать під ними – нижні щелепи, несуть невеликі нижньощелепні щупики, які мають вигляд маленьких опушених волосками горбиків.

Зарисуйте зовнішній вигляд личинки блохи. Позначте голову, груди, черевце, вусики, відштовхувачі.

Робота 7. Вивчення життєвого циклу блохи собачої (*Ctenocephalides canis*)

Розгляньте на таблиці фази розвитку бліх і зарисуйте схему їх життєвого циклу (Рис. 7). Позначте всі фази розвитку.




Рис. 7. Життєвий цикл блохи собачої (*Ctenocephalides canis*): 1 – яйце, 2 – личинка, 3 – лялечка, 4 – кокон, 5 – імаго

Лабораторна робота № 6

Тема: Особливості морфології і біології справжніх, каліфорових і саркофагових мух.

Мета: На прикладі кімнатної мухи та різних видів синантропних мух ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати ротових апаратів, кінцівок та яйцекладів мух, тотальні препарати яєць, личинок, пупарії та колекції мух, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика синантропних мух.
2. Систематичний огляд синантропних мух, представники.
3. Морфологія синантропних мух.
4. Особливості живлення синантропних мух.
5. Особливості розвитку і розмноження синантропних мух.
6. Медико-ветеринарне значення синантропних мух.
7. Факультативний та облігатний паразитизм личинок синантропних мух
8. Боротьба з мухами.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Підряд Коротковусі двокрилі – Brachicera

Родина Справжні мухи – Muscidae

Муха кімнатна – Musca domestica

Муха базарна – Musca sorbens

Муха домова – Muscina stabulans

Муха мала кімнатна – Fannia canicularis

Жигалка осіння – Stomoxys calcitrans

Родина сині і зелені м'ясні мухи – Calliphoridae

Каліфора синя – Calliphora erythrocephala

Муха весняна синя – Protophormia terrae-novae

Зелена м'ясна муха звичайна – Lucilia illustris

Родина сірі м'ясні мухи – Sarcophagidae

Саркофага сіра – Sarcophaga carnaria

Саркофага українська – Sarcophaga ukrainica

Вольфартова муха звичайна – Wohlfartia magnifica

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови кімнатної мухи

Розгляньте кімнатну муху під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x .

Тіло мухи розділяється на три відділи: голову, груди і черевце. Всі ці відділи, а також три пари ніг, які прикріплені до грудних сегментів, густо вкриті волосками і щетинками. Одна пара крил прикріплюється до бічних поверхонь середньогрудей (Рис. 1).

Зарисуйте загальний вигляд кімнатної мухи (зі спинної сторони).
Позначте частини тіла і придатки грудей.




Рис. 1. Розчленування тіла мухи *Musca domestica*: 1 – голова, 2 – передня нога, 3 – груди, 4 – крило, 5 – середня нога, 6 – задня нога, 7 – черевце

Робота 2. Вивчення зовнішньої будови голови кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x голову кімнатної мухи.

Голова напівкуляста, опукла спереду і сплюснена ззаду. Бічні частини голови зайняті великими фасеточними очима, між якими залишається досить широка лобна смужка, усаджена двома рядами щетинок, створюючих «алейку». До верхнього краю голови лобна смужка розширюється і утворює ділянку, на якій розташовані три простих вічка; донизу смужка упирається в

арку дугоподібного шва, що обмежує лице, яке майже цілком прикрите вусиками. Краї дугоподібного шва, огинаючі нижньобічні частини лица, усаджені товстими щетинками – вибрисами. Між дугоподібним швом і нижнім краєм очей є скули; від них відходять вузькі пластинки, що оздоблюють очі по всьому їх колу. Нижньобічні частини голови (під очима) носять назву щік. Вусики короткі, трьохчленикові; останній (третій) членик у три рази більше другого, несе трьохчленикову волоттеподібну щетинку. На тім'ї між вічками видно так звані оцелярні щетинки, а назад і з боків від них розташовані міцні зовнішні і внутрішні тім'яні і затім'яні щетинки. З нижньої поверхні голови видається хоботок (Рис. 2).

Зарисуйте загальний вигляд голови (вигляд спереду). Позначте структури її зовнішньої будови.




Рис. 2. Голова кімнатної мухи, вигляд спереду: 1 – вусики, 2 – «але́йка», 3 – дугоподібний шов, 4 – лобна смужка, 5 – складне око, 6 – просте вічко, 7 – зовнішня тім'яна щетинка, 8 – внутрішня тім'яна щетинка, 9 – затім'яна щетинка, 10 – вібриси, 11 – аристи, 12 – хоботок, 13 – вилиця

Робота 3. Вивчення ротового апарату самки кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x препарат ротового апарату кімнатної мухи. Ротовий апарат кімнатної мухи лижучого типу (Рис. 3). Він складається з конусоподібної основної частини (rostrum),

прилеглої безпосередньо до голови, і жолобоподібної вершинної частини – смоктальця (haustellum) з роздвоєними на кінці великими смоктальними лопатями. Смоктальце є видозміненою нижньою губою, що має спереду поглиблення у вигляді жолобка, в якому поміщаються гіпофаринкс і верхня губа. Ззаду і з боків смоктальце покрите великим склеритом – підборіддям (mentum). Поверхня смоктальних лопатей вкрита паралельними хітинізованими жолобками – псевдотрахеями, по яких рідка їжа надходить у ротовий отвір, що знаходиться в глибокій виїмці між лопатями. Для зіскоблювання сухої і напівсухої їжі мусі служать хітинові передротові зуби, розташовані з боків ротового отвору. Спереду жолоб нижньої губи прикритий верхньою губою, утворюючи разом з нею трубкоподібну порожнину, в якій поміщається непарний орган – гіпофаринкс, пронизаний слинною протокою. На передній поверхні основи хоботка сидять одночленикові нижньощелепні щупики, густо вкриті волосками.

Зарисуйте загальний вигляд ротового апарату кімнатної мухи.




Рис. 3. Хоботок кімнатної мухи, вигляд спереду: 1 – вусики, 2 – верхня губа, 3 – нижня губа, 4 – губна лопать, 5 – ротовий отвір, 6 – нижньощелепний щупик, 7 – фасеткові очі, 8 – вібриси, 9 – основа хоботка

Робота 4. Вивчення будови грудей кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x зверху та збоку груди кімнатної мухи.

Груди із спинного боку (Рис. 4) мають вигляд подовженої п'ятикутної пластинки, розділеної двома поперечними швами на три нерівних частини. Вся видима зверху частина грудей відноситься до середньоспинки. Слабо виражений поперечний шов перед основою крил відокремлює передню частину середньоспинки від крупнішої середньої її частини; глибший другий поперечний шов відокремлює щиток трикутної форми, що нависає над черевцем. Передні кути середньоспинки – плечові горбки – опуклі. На сіро-бурому фоні середньоспинки помітні 4 темних поздовжніх смуги. Покрив її несе щетинки, розміщені рядами: акростихальні – на серединній світлій смугі (перед другим поперечним швом); дорзоцентральні – уздовж світлих проміжків між темними смугами; інтраалярні – із-зовні від них; надкрилові – ще ближче до місця прикріплення крил; плечові – на плечових горбках, і, дещо назад, – заплечові.




Рис. 4. Схеми будови грудей мух: А – вигляд зверху, Б – вигляд збоку: 1 – поперечний шов середньоспинки; 2 – щиток; 3 – плечові горбики; 4 – плеври передньогрудей; 5 – грудні дихальця; 6 – основа крила; 7 – дзизкальце; 8 – тазики; 9 – мезоплевры; 10 – стерноплевры; 11 – гіпоплевры. Щетинки: 12 – акростихальні; 13 – дорзоцентральні; 14 – мезоплевральні; 15 – стерноплевральні; 16 – гіпоплевральні

Збоку грудей є ряд різної форми пластинок, або склеритів, відокремлених одна від одної більш менш вираженими швами (Рис. 4). Назад і донизу від плечового горбка відкривається переднє дихальце, або стигма, яке має вигляд темнуватої пластинки з поздовжньою щілиною. Попереду від нього знаходиться проплевра, а назад – добре виражена, велика мезоплевра. Нижній кінець проплеври і передній кінець мезоплеври з'єднуються з основою передніх ніг; під нижнім краєм мезоплеври лежить трикутна стерноплевра, що прикриває собою основу середньої пари ніг. Позаду стерноплеври розташована гіпоплевра, над верхнім краєм якої поміщається заднє дихальце. Безпосередньо під крилом знаходиться птероплевра, а назад від неї – метаплевра. Поряд із задніми дихальцями сидять булавоподібні дзизкальця. На стерноплеврі є три міцні щетинки.

Зарисуйте схему будови грудей (вигляд зверху та збоку) кімнатної мухи. Позначте деталі будови та основні щетинки.

Робота 5. Вивчення будови кінцівки кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x ноги і при збільшенні 7^x лапку кімнатної мухи (Рис. 5).




Рис. 5. Будова ноги мухи: А – нога *Musca domestica*; Б – п'ятий членок лапки кімнатної мухи: 1 – тазик, 2 – вертлюг, 3 – стегно, 4 – гомілка, 5 – лапка, 6 – кігтик, 7 – пульвіли

Кожна нога складається з тазика, вертлюга, стегна, гомілки і п'ятичленикової лапки. На останньому члену лапки, під кігтиками, знаходяться клейкі подушечки (пульвіли), що дозволяють мусі легко утримуватися і пересуватися по гладкій прямовисній поверхні. Між ними розташований третій (непарний) придаток – емподій, який у кімнатної мухи недорозвинений і має вигляд досить міцної світлої щетинки, добре помітної з нижнього боку лапки.

Зарисуйте ногу і окремо дистальний членок лапки кімнатної мухи. Позначте деталі їх будови.

Робота 6. Вивчення крила кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x крило кімнатної мухи.

Пластинка крила прозора, видовжена, з округлою вершиною і вузькою основою, де є 3 листоподібні лопасти: крильце, крилова і плечова лусочки (Рис. 6).




Рис. 6. Будова крила кімнатної мухи (*Musca domestica*): 1 – костальна жилка, 2 – субкостальна жилка, 3-5 – радіальні жилки, 6 – медіальна жилка, 7 – кубітальна жилка, 8 – анальна жилка, 9 – радіомедіальна жилка, 10 – крильце, 11 – крилова і плечова лусочки

Серед поздовжніх жилок розрізняються: костальна, що огинає передній край крила; субкостальна, що зливається з нею приблизно на відстані одній

третині від основи крила; радіальні, такі, що відходять загальним стовбуром і з'єднуються з костальною на середині переднього краю, поблизу вершини і на вершині крила; медіальна, така, що робить злам у бік радіальної жилки і зливається з костальною поряд з останньою; кубітальна і анальна, направлені до заднього краю крила. Між останньою радіальною і медіальною жилками є поперечна радіомедіальна жилка, що обмежує разом з ними передню базальну комірку. Дві поперечні жилки між медіальною і кубітальною жилками замикають меншу задню базальну і велику дискоїдальну комірки. Поперечна жилка між кубітальною і анальною жилками обмежує разом з ними анальну комірку. Крім того, поздовжні жилки розділяють поверхню крила на костальну, субкостальну, першу і другу радіальні і задньокрайні комірки.

Зарисуйте крило кімнатної мухи і позначте основні жилки і лопасти крила.

Робота 7. Вивчення будови черевця і телескопічного яйцекладу кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x черевце самки кімнатної мухи. Черевце складається з чотирьох видимих сегментів. Останні три сегменти у самки утворюють телескопічний, або несправжній яйцеклад (Рис. 7). Верхні півкільця черевця (тергіти) – загалом сіруватого кольору, з неявно вираженою темною смугою посередині і темними плямами на боках. Кожен тергіт має пару дихалець; на першому тергіті їх дві пари (в результаті злиття двох перших черевних сегментів). Нижні півкільця (стерніти) – жовтуваті з темною смугою посередині і темними плямами на боках.

Зарисуйте черевце самки кімнатної мухи і позначте його основні структури.




Рис. 7. Черевце кімнатної мухи: 1 – тергіти, 2 - стерніти, 3 – дихальця, 4 – церки, 5 – телескопічний яйцеклад

Робота 8. Вивчення зовнішньої будови преімагінальних фаз розвитку кімнатної мухи

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x яйця і при збільшенні 2^x личинок III віку та пупарії кімнатної мухи.

Яйця мухи (Рис. 8) видовжено-овальні, з одним більш загостреним кінцем, білого кольору; від одного полюса до іншого йдуть дві вузькі борозенки, що з'єднуються на звуженому кінці. Довжина близько 1 мм.

Личинки III віку мають довжину 1,0-1,2 см (Рис. 8). Тіло складається з 12 добре виражених сегментів (другий і третій сегменти зливаються). На передньому сегменті з черевного боку розташований ротовий отвір, оточений ротовими борозенками, що відходять радіально. У передній частині зверху цей сегмент розділений поздовжньою щілиною на дві частки, кожна з яких несе короткий двучлениковий вусик, нижньощелепний щупик і пару чутливих горбиків. З ротового отвору висовуються парні ротові гачки, які личинка використовує для пересування і зіскоблювання живильного субстрата. Услід за щелепними йдуть гіпостомальні склерити, які зчленовані з розвиненими глотковими склеритами. Всі ці утворення разом складають ротоглотковий апарат. На боках заднього краю другого сегменту розташовані 5-7-променеві передні дихальця. Валики для повзання на черевній поверхні V-XII сегментів сильно виражені, покриті рядами дрібних шипиків. На задній поверхні

останнього сегменту видно округло-ниркоподібні пластинки задніх дихалець із сильно склеротизованою перитремою (обідком) і стигмальним диском. Дихальця мають вигляд трьох зигзагоподібних щілин з поперечними перегородками.

Пупарій (несправжній кокон) зберігає барицьцеподібну форму (Рис. 8), сліди сегментації покривів личинки, передні і задні дихальця, шипики на черевних сегментах, тощо. Новоутворенням є так звані ріжки – невеликі конусоподібні вирости на межі першого і другого черевних сегментів несправжнього кокона з дрібними отворами на вершині. Це грудні дихальця лялечки. Якщо розкрити пупарій через 30-40 годин після перетворення в лялечку, то під оболонкою знаходимо власне лялечку з рисами імаго, що вже сформувалось.

Зарисуйте і позначте преімагінальні фази розвитку кімнатної мухи.




Рис. 8. Преімагінальні фази розвитку кімнатної мухи: 1 – яйце, 2 – личинка III віку, 3 – пупарій з лялечкою

Робота 9. Визначення синантропних мух різних видів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $0,6^x-1^x$ синантропних мух різних видів. За допомогою ентомологічної літератури визначте синантропних мух: муху кімнатну, муху малу кімнатну, муху хатню, жигалку осінню, зелену та синю м'ясну муху, сіру м'ясну муху та ін.

Родина Справжні мухи (Muscidae).

Хатня муха (*Muscina stabulans*) більше кімнатної (7-9 мм), атласно-сірого кольору з чотирма темними смугами на середньоспинці і плямами на черевці. Щупики, гомілки ніг і вершина щитка середньоспинки червонувато-жовті. Медіальна жилка дугоподібно зігнута у напрямку до переднього краю крила (Рис. 9).




Рис. 9. Самці мусцид: А – хатня муха, Б – мала кімнатна муха

Мала кімнатна муха (*Fannia canicularis*) – дрібна муха (5-6 мм), темно-сірого кольору з трьома чорними смугами на середньоспинці і серединною темною смугою на черевці. У самців голова біла, з вузьким чорним лобом; передні сегменти черевця з боків просвічують, жовтуваті. У самок голова сіра, лоб широкий, черевце більш однотонне, темно-сіре, у основи жовтувате. Медіальна жилка крила пряма, утворює невеликий злам у місці відходження від неї поперечної (медіокубітальної) жилки (Рис. 9).




Рис. 10. Самки мусцид: А – кімнатна муха, Б – жигалка осіння

Жигалка осіння (*Stomoxys calcitrans*). На вигляд жигалка схожа на кімнатну муху (Рис. 10), відрізняючись від неї наявністю тонкого і довгого колючого хоботка, що стирчить попереду, з короткими і тонкими щупиками. Середньоспинка світло-сірого кольору з чотирма темними поздовжніми смугами; черевце з темними округлими плямами. Медіальна жилка дугоподібно зігнута у напрямку до переднього краю крила. У спокійному стані крила широко розставлені.

Родина Каліфорові, або сині та зелені м'ясні мухи (Calliphoridae).

Синя м'ясна муха (*Calliphora erythrocephala*) – велика муха (14 мм) темно-синього кольору з металевим вилиском, вкрита міцними чорними волосками. Лице і щоки оранжево-жовтого кольору з чорними волосками; передні грудні дихальця оранжеві (Рис. 11).

Зелена м'ясна муха (*Lucilia caesar*) – муха середніх розмірів (6-10 мм), темно-зеленого кольору з металевим вилиском: лице і щоки жовто-білі, щупики жовті, очі червоні, передні грудні дихальця темні. За поперечним швом середньоспинки є дві пари акростихальних щетинок. У самців лоб дуже вузький (Рис. 11).




Рис. 11. Каліфорові та саркофагові мухи: А – каліфора, Б – люцилія, В – саркофага

Родина Саркофагові, або сірі м'ясні мухи (Sarcophagidae).

Сіра м'ясна муха (*Sarcophaga cantaria*) – велика сіра муха (10-14 мм) з 5 темними подовжніми смугами на середньоспинці і шаховому рисунку на черевці. Вилиці і щоки золотисто-жовті, широкі, видаються вперед. За поперечним швом середньоспинки є одна пара акростихальних щетинок (перед щитком) і 4 пари дорзоцентральных; другий тергіт черевця посередині заднього краю несе пару міцних щетинок; два останні сегменти черевця чорні (Рис. 11).

Оформіть таблицю, де вкажить родини та назви визначених видів мух з трьох родин: справжні мухи, сині та зелені м'ясні мухи, сірі м'ясні мухи.

Лабораторна робота 7

Тема: Особливості морфології і біології оводів та кровососок.

Мета: На прикладі носоглоткових, підшкірних та шлункових оводів ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати і макропрепарати (імаго, яйця, личинки і лялечки), колекції оводів, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика оводів.
2. Систематичний огляд носоглоткових, підшкірних та шлункових оводів, представники.
3. Морфологія імаго оводів.
4. Морфологія личинок оводів.
5. Біологія оводів і відповідність їх певним живителям.
6. Особливості розвитку і розмноження оводів.
7. Медико-ветеринарне значення оводів.
8. Боротьба з оводами.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Підряд Коротковусі двокрилі – Brachicera

Родина Шлункові оводи – Gastrophilidae

Шлунковий овід великий – *Gastrophilus intestinalis*

Шлунковий овід східний, травняк – *Gastrophilus pecorum*

Родина Носоглоткові оводи – Oestridae

Носоглотковий овід овечий (кручак) – *Oestrus ovis*

Носоглотківник північний (сяну) – *Cerphenomyia trompe*

Родина Підшкірні оводи, Дрокові – Nyropodermatidae

Дрік звичайний (строка) – *Nyropodermata bovis*

Дрік південний (стравохідник) – *Nyropodermata lineatum*

Родина Кровососкові – Nyropoboscidae

Оленяча кровососка європейська – *Lipopterna cervi*

Кровососка собача – *Nyropobosca longipennis*

Кровососка кінська – *Nyropobosca equina*

Вовноїд овечий, кровососка овеча – *Melophagus ovinus*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови самок оводів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x самок шлункового, підшкірного та носоглоткового оводів.

Голова, груди і черевце шлункових оводів вкриті волосками, місцями густими і довгими, місцями рідкими і короткими; щетинки на тілі, у тому числі і на грудях, відсутні (Рис. 1).




Рис. 1. Зовнішня будова самок оводів: А – шлункового овода великого (*Gastrophilus intestinalis*), вигляд збоку; Б – підшкірного овода звичайного (*Hypoderma bovis*), вигляд зверху; В – носоглоткового овода овечого (*Oestrus ovis*), вигляд зверху 1957)

У великого шлункового овода тіло жовто-бурого кольору, завдовжки до 20 мм. На грудях і черевці помітні коричневі плями. Крила з темними плямами. Лапки розвинені. Стерніти черевця дуже ніжні, слабо пігментовані або прозорі. Дихальця розташовані на черевній перетинці поблизу від бічних країв тергітів. Яйцеклад у самок, як правило, довгий, у вигляді підігнутої під черевце трубки (Рис. 1).

Голова шлункових оводів жовтувата, спереду опукла. З боків голови розташовуються два великих голих (без волосків) фасеточних ока. Три простих вічка у всіх видів роду *Gastrophilus* добре розвинені і розташовані на особливому склериті темнішого кольору (вічковому трикутнику), який розташований між очима, на межі між потилицею і лобом. Лоб розташовується

у верхній половині голови, між внутрішніми краями очей. У самок лоб завжди ширший, ніж у самців. Знизу лобна смужка обмежена дугоподібним швом. Вусики короткі, вони лежать у глибокій вусиковій ямці, довжина їх складає менш половини висоти лицевої частини голови. 3-й членик вусика заокруглений, як правило більше 1-го і 2-го. Ротові частини відсутні або представлені двома рудиментарними щупиками. Ариста гола (Рис. 2).

Тіло підшкірних оводів вкрите густими волосками коричневого, сірого, жовтого та чорного кольорів. Голова вужча, ніж середня частина грудей. Зверху на середньоспинці чітко помітні довгасті смуги чорного кольору. Крила коричневі, прозорі. Лапки розвинені. Черевце овальне. Довжина тіла до 15 мм (Рис. 1).

На голові підшкірних оводів фасеточні очі голі, у самців більш великі. Прості вічка розташовані на вічковому трикутнику. Ширина лобу варіює у різних видів, у самців лоб вужчий. Лице найчастіше щитоподібне, вкрите густими волосками. Вусики короткі і широкі. Третій членик вусика кулеподібний або чечевицеподібний. Ротовий апарат атрофований (Рис. 2).

Носоглоткові оводи мають збите тіло, завдовжки 10-15 мм. Його довжина перевищує ширину середньоспинки в 2-2,5 рази. У більшості видів тіло вкрите нечисельними волосками. Короткі волоски вкривають переважно нижню поверхню тіла. Голова ширша за масивні груди. Груди сильно розвинуті, значно перевищують об'єм черевця. Крила великі. Лапки короткі, слабо опушені. Черевце округле, випукле. Яйцеклад самок дуже короткий і не виступає за кінець черевця (Рис. 1).

У носоглоткових оводів голова містить фасеткові очі бурого кольору, голі, у самців вони помітно більше. Лоб широкий, у самців завжди вужчий. Вусики з вільним 3-м члеником і з голою аристою. Ротові частини сильно редуковані (Рис. 2).

Зарисуйте загальний вигляд комах із стинної сторони та будову голови представників кожної родини оводів.




Рис. 2. Зовнішня будова голів оводів: 1 – шлункового овода *Gastrophilus*, самець; 2 – підшкірного овода *Hypoderma*, самка; 3 – носоглоткового овода *Oestrus*, самка

Робота 2. Вивчення будови яєць оводів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом "МБС-10" при збільшенні 2^x яйця оводів. Яйця шлункових оводів жовті, блискучі, клиноподібні, до 1,25 мм завдовжки. На одному з полюсів вони мають округлу кришечку, яка відпадає при виході личинки. Поверхня яєць з різкими поперечними лініями, рідко сітчаста. В нижній частині яйця розміщений придаток, що має вигляд двох лопатей, які обгортають волосину (Рис. 3).




Рис. 3. Яйця оводів: А – *Gastrophilus haemorrhoidalis* (за Груніним, 1950), Б – *Gastrophilus intestinalis* (за Груніним, 1950), В – *Hypoderma bovis* (за Груніним, 1962)

У підшкірних оводів яйця видовжено-овальні. Кришечки для виходу личинки немає. Прикріпний придаток являє собою пластинку, що з'єднана із стебельцем у основи яйця (Рис. 3).

Зарисуйте зовнішній вигляд яєць дрока і шлункових оводів.

Робота 3. Вивчення будови личинок оводів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинок III віку шлункового, підшкірного та носоглоткового оводів.

Тіло личинок шлункових оводів III віку велике, до 16-20 мм завдовжки. Воно має овально-циліндричну форму і сплющене у спинно-черевному напрямку, передній кінець загострений, задній – заокруглений (Рис. 4). Ротові гачки добре розвинені. На члениках є шипи, розміщені у два ряди. Шипи першого ряду масивні, другого – дрібні. Задні дихальця розміщуються на вершині VIII черевного членика, в глибокій порожнині.

Личинки підшкірних оводів III віку масивні, видовжено овальні, завдовжки до 28 мм, темно-коричневі. Задні дихальця мають вигляд лійки (Рис. 4). Шипи з вентрального боку личинок закінчуються на шостому сегменті.

Личинки носоглоткових оводів III віку видовжено-овальної форми, до 30 мм завдовжки, коричневого кольору з поперечними смугами. Їхнє тіло з вентральної сторони плоске, з дорсальної – опукле (Рис. 4). Задні дихальця плоскі, відкриті.




Рис. 4. Личинка III віку метаморфозу личинок оводів: А – шлунковий овід вусоклей (*Gastrophilus haemoroidalis*), з черевної сторони; Б – носоглотковий овід овечий, або кручак (*Oestrus ovis*), з черевної сторони; В – підшкірний овід звичайний, або строка (*Hypoderma bovis*), з спинної сторони ; Г – те саме, з черевної сторони; Д – те саме, задні дихальця

Зарисуйте личинку підшкірного овода (з черевної і спинної сторони) та її задні дихальця.

Робота 4. Вивчення будови пупарія підшкірного овода

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x пупарій підшкірного овода. Лялечка (пупарій) підшкірного овода зберігає характерні ознаки личинки III віку, оскільки екзувій формується при скороченні і затвердінні личинкових покривів. Пупарний шов обмежує кришечку, через яку імаго овода виходить назовні (Рис. 5).

Зарисуйте пупарій овода після виходу з нього імаго.



Рис. 5. Пупарій підшкірного овода з відкинutoю кришечкою: 1 – отвір від кришечки

Робота 5. Вивчення зовнішньої будови кровососок

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x рунця овечого та кровососку кінську. Зверніть увагу на форму тіла кровососок, особливості будови ротових органів, наявність або відсутність крил та розташування кінцівок.

Рунець овечий – безкрила комаха жовто-бурого кольору. Тіло сплюснене у спино черевному напрямку, вкрите волосками і щетинками. Голова невеличка, щільно прилягає до грудей. Фасеткові очі коричневі. Хоботок колючо-сисного типу, тонкий і довгий. З боків до нього прилягають максилярні щупики, густо опушені волосками. Вусики короткі, двочленисті. Тазики ніг широко розставлені. Лапки на кінці мають серпоподібні кігтики. Черевце широке, злегка сегментоване (Рис. 6).




Рис. 6. Кровососкові (Нуррбосцидає): А – рунець овечий; Б – кровососка кінська: 1 – зовнішній вигляд, 2 – голова, 3 – крило

Кінська кровососка має завдовжки 7-9 мм. Її тіло сплющене у дорзовентральному напрямку. Голова плеската і направлена вперед. Ротовий апарат колючо-сисного типу. Має великі прозорі овальні крила, з невеликим числом жилок. У спокійному стані крила знаходяться над черевцем і накладаються одне на друге (Рис. 6). Голова і груди темно-бурого кольору зі світло-жовтими смужками і плямами, черевце і лапки коричневі.

Зарисуйте зовнішній вигляд рунця овечого та кровососки кінської, їх голови та крило кровососки кінської.

МОДУЛЬ 2. ГНУС

Лабораторна робота 8

Тема: Особливості морфології і біології імаго та преімагінальних фаз малярійних комарів.

Мета: На прикладі звичайного малярійного комара ознайомитися з особливостями будови самців і самок, їх яєць, личинок та лялечок, навчитися визначати комарів роду *Anopheles*.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати і тотальні препарати ротових апаратів, голів самок і самців, препарати яєць, личинок і лялечок малярійного комара, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика підродини Anophelinae.
2. Морфологія імаго малярійних комарів.
3. Морфологія личинок малярійних комарів.
4. Морфологія лялечок малярійних комарів.
5. Морфологія яєць малярійних комарів.
6. Біологія малярійних комарів та особливості їх живлення.
7. Особливості розвитку і розмноження малярійних комарів.
8. Медико-ветеринарне значення малярійних комарів.
9. Систематичний огляд малярійних комарів, представники.
10. Боротьба з малярійними комарами.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Родина Комарі звичайні – Culicidae

Підродина Анофелінові – Anophelinae

Малярійний комар звичайний – Anopheles maculipennis

Малярійний комар джерельний – Anopheles claviger

Малярійний комар очеретяний – Anopheles hyrcanus

Малярійний комар прикрашений – Anopheles superpictus

Малярійний комар білий – Anopheles pulcherimus

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови самки малярійного комара

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x самку малярійного комара. Тіло комара, чіткими межами розділено на три відділи: голову, груди і черевце (Рис. 1). Із боків голови помітні великі темнозабарвлені складні фасеточні очі. Між очима над основою хоботка помітно чубчик – пучок довгих волосків. Знизу голови приєднується довгий тонкий колючий хоботок. На голові також є одна пара членистих вусиків, що вкриті волосками.

Груди комара складаються з трьох сегментів, що злилися: передньо-, середньо- і заднегрудей. Найбільший з них – середньогруди. Дорзальна поверхня грудей майже повністю відноситься до середньогрудей і тому називається середньоспинкою. Для *Anopheles maculipennis* характерна наявність на середньоспинці широкої сірої подовжньої смуги, в той час, як бічні частини середньоспинки мають дещо темніше коричневе забарвлення.

З боків грудей є дві пари дихальних отворів – дихалець, з яких краще помітно передні. До середньогрудей причленяється одна пара крил. Позаду основ крил слід знайти два невеликих булавоподібних придатки задньогрудей – дзизкальця, що є рудиментами задньої пари крил. Знизу до грудей причленяються 3 пари ніг, які складаються з потовщеного, короткого тазика, маленького короткого вертлюга, стегна, гомілки і п'ятичленикової лапки, що закінчується парою кігтиків.

Черевце складається з 8 сегментів. Хітиновий покрив кожного сегменту складається з двох пластинок – спинної (тергіт) і черевної (стерніт), сполучених еластичними перетинками, на яких розташовуються черевні дихальця. Розгляньте їх під мікроскопом на великому збільшенні. Тергіти і стерніти густо усаджені волосками. Лусочки на черевці у більшості видів малярійних комарів, зокрема у *Anopheles maculipennis*, відсутні.




Рис 1. Малярійний комар (*Anopheles maculipennis*), самка:

А – загальний вигляд, Б – схема розташування комара на вертикальній чи горизонтальній поверхні

У малярійних комарів частини тіла (голова з хоботком, груди і черевце) розташовуються на одній лінії; тіло комара утворює з поверхнею, на якій він сидить, кут в 45-70° (Рис. 1).

Зарисуйте загальний вигляд самки малярійного комара із спинної сторони і схему її положення при посадці.

Робота 2. Вивчення будови голів малярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x голови самців та самок малярійних комарів (Мал.2).

З боків голови можна бачити великі фасеткові очі. При сильному збільшенні видно, що око складається з великої кількості окремих фасеток. Попереду від очей до голови прикріплюються багаточленикові вусики. За будовою вусиків, які вкриті густими довгими волосками, навіть неозброєним оком можна визначити стать у комарів будь-якого виду (у самців вусики більш пухнасті). На нижній частині голови з боків хоботка розташовуються парні нижньощелепні щупики. У малярійних комарів вони

за довжиною приблизно дорівнюють хоботку. Два останні членики щупиків самця булавоподібно потовщені і вкриті досить довгими густими волосками. У самки щупики покриті лусками і короткими волосками.

Зарисуйте загальний вигляд голів самців та самок малярійних комарів і позначте хоботки, вусики та щупики.




Рис 2. Голови малярійних комарів:

А – самка; Б – самець. 1 – вусик, 2 – максиллярний щупик, 3 – хоботок

Робота 3. Вивчення будови ротового апарату комарів

Під мікроскопом «МБР-1» на великому збільшенні розгляньте тотальний мікропрепарат хоботка комара.

Ротовий апарат комара належить до колючо-сисного типу. Хоботок утворений нижньою губою (labium) і має форму жолоба, в якому знаходяться інші частини ротового апарату. Вони мають вигляд вузьких пластин або голок жовтуватого кольору (Рис. 3). Це, зокрема, пара нижніх щелеп (maxillae), пара верхніх щелеп (mandibulae), підглотівник (hypopharynx) і верхня губа (labrum). Зовні нижня губа має вигляд широкої темної пластинки, вкритої лусочками і короткими волосками. Нижньогубні щупики рудементовані.




Рис. 3. Будова хоботка самки малярійного комара: А – голова з розщепленим хоботком; Б – поперечний переріз хоботка: 1 – нижня губа, 2 – верхня губа, 3 – нижні щелепи, 4 – верхні щелепи, 5 – гіпофаринкс, 6 – нижньо-щелепні щупики. 7 – канал верхньої губи, 8 – канал гіпофаринксу, 9 – нерв верхньої губи, 10 – нерв нижньої губи, 11 – м’язи; 12 – трахеї

Поперечний переріз хоботка самки комара розгляньте при сильному збільшенні мікроскопа "МБР-1". Основу хоботка складає нижня губа. У її товщі видно перерізані поздовжні м'язові пучки, а також трахейні стовбури, округлі в поперечному перерізі (Рис. 3). У дорзальній половині нижньої губи помітна округла глибока вирізка – розріз жолобка, в якому: поміщаються колючі частини. Велика частина порожнини жолобка зайнята верхньою губою у вигляді замкнутої трубки, по якій під час ссання крові тече кров. Під верхньою губою розташований гіпофаринкс у вигляді поперечної витягнутої пластинки з потовщенням в центрі, пронизаного слинним каналом. Діаметр цього каналу в десятки разів менше діаметру каналу верхньої губи. З боків, між верхньою і нижньою губою, розміщаються щелепи: верхня у вигляді тонкої пластинки і нижня – з потовщенням по внутрішньому краю.

Зарисуйте ротовий апарат самки малярійного комара з розщепленим хоботком і поперечний переріз хоботка самки комара, позначте основні структурні елементи.

Робота 4. Вивчення будови щитка малярійних комарів

Під мікроскопом «МБР-1» на великому збільшенні розгляньте верхню частину грудей самки малярійного комара і знайдіть щиток. Він представляє собою пластинку, що обмежує середньоспинку ззаду. У малярійних комарів задній край щитка утворює рівну дугу, усаджену щетинками, які складають суцільний ряд (Рис. 4).

Зарисуйте щиток малярійного комара.



Рис. 4. Щиток малярійного комара

Робота 5. Вивчення будови крила малярійних комарів

На малому збільшенні мікроскопа «МБР-1» розгляньте тотальний мікропрепарат крила малярійного комара. Крило має вигляд тонкої прозорої пластинки, покресленою жилками (Рис. 5). Пластинка крила вкрита дрібними волосками. Уздовж жилок і по краю крила розташовуються лусочки. У більшості видів на крилах є плями, сформовані зі скупчень лусочок.




Рис. 5. Крило малярійного комара: А – жилкування крила, Б – область поперечних жилок малярійного комара (збільшено). Жилки: 1 – костальна; 2 – субкостальна; 3-6 – перша-четверта радіальні; 7-8 – передня і задня медіальні; 9-10 – передня і задня кубітальні; 11 – анальна; 12 – радіомедіальна (передня поперечна); 13 – медіально-кубітальна (задня поперечна)

По краю крила проходить костальна жилка. Поздовжні жилки: субкостальна – впадає у передній край крила біля його вершини; чотири радіальні, впадають поблизу вершини крила; дві медіальні жилки впадають у верхню задню частину крила, утворюючи середню вилку крила; дві

кубітальні жилки утворюють задню вилку крила; анальна жилка впадає біля середини заднього краю крила.

Менш помітні короткі поперечні жилки; жилкування крил виразніше виступає у світлі, що проходить. У малярійних комарів остання з радіальних жилок (найкоротша поздовжня жилка, що впирається у вершину крила) перетинає у напрямі до основи крила радіомедіальну поперечну жилку і починається самостійно в центрі крила, що краще можна розглянути на великому збільшенні під мікроскопом.

Зарисуйте крило малярійного комара та область поперечних жилок, позначте поздовжні та поперечні жилки.

Робота 6. Вивчення будови яєць і яйцекладок малярійних комарів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x або мікроскопа «МБР-1» на малому збільшенні яйця малярійних комарів. Форма яйця подовжена, кінці звужені. Край зовнішньої поверхні яйця оточений тонкою, прозорою, заповненою повітрям облямівкою, що розширюється з боків у вигляді двох поплавців (повітряних камер). Поплавці мають ребристі виступи; перетинка між ними може бути гладкою або зморшкуватою, покресленою (Рис. 6). Забарвлення яйця розглядають при падаючому світлі. Воно залежить від особливостей будови зовнішнього шару шкаралупи (екзохориону) яйця. Екзохоріон складається з безлічі найдрібніших стовпчиків різної висоти, які створюють рисунок у вигляді темних плям або смуг. На одному з полюсів яйця є отвір – мікропіле.

Яйця малярійних комарів плавають по одинці, або зчеплено по кілька штук у вигляді характерних фігур: стрічок, зірочок, трикутників, які тимчасово утворюються при струшуванні (Рис. 6).

Зарисуйте яйцекладку і зовнішній вигляд зверху і збоку яйця малярійного комара, позначте повітряні камери і мікропіле.




Рис 6. Яйця малярійних комарів (*Anopheles maculipennis*):

А – яйце, вигляд збоку; Б – яйце, вигляд зверху; В – кладка яєць: 1 – повітряні камери (поплавці), 2 – мікропіле

Робота 7. Вивчення зовнішньої будови личинок малярійних комарів IV віку

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $1\times$ і $2\times$ личинку малярійного комара IV віку. Тіло личинки розділяється на голову, груди і черевце. Голова різко відмежована; межа грудей черевця менш виразна. Тіло вкрите волосками, особливо довгими на грудях, на передніх сегментах черевця і на задньому його кінці (Рис. 7).

Голова личинки має округло-квадратну форму. Добре помітні складні очі. З боків переднього краю голови розташовуються паличкоподібні вусики. Ротовий апарат знаходиться на черевній стороні. Він краще помітний, якщо личинка лежить черевною стороною догори. Основними частинами ротового апарату є верхня губа з парою щіток (бічних пучків густих тонких волосків), дві пари щелеп і нижня губа.




Рис. 7. Личинка малярійного комара (*Anopheles maculipennis*) IV віку:

А – вигляд із спинної сторони, Б – схема розташування личинки у воді під час живлення: 1 – щітки, 2 – плечові лопаті, 3 – зірчасті волоски, 4 – стигмальна пластинка, 5 – плавець, 6 – анальні зябра

Груди, що складаються з трьох злитих між собою сегментів, ширші за голову і черевце. З боків переднього краю спиної сторони грудей розміщені порожні прозорі вирости тіла – плечові лопаті. Черевце складається з 9 сегментів. На спинній поверхні кожного сегменту, з 3 по 7, є пара зірчастих або пальмоподібних волосків. Стигмальна пластинка, яка розташована на спинній стороні передостаннього сегменту черевця, містить парні стигми (дихальні отвори личинки). На останньому сегменті черевця є плавець із розгалужених волосків, що розходяться віялом. На кінці тіла помітні чотири видовжені прозорі придатки — анальні зябра.

Зарисуйте личинку малярійного комара зі спинного боку та позначте деталі її будови.

Робота 8. Вивчення зовнішньої будови лялечок малярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x лялечку малярійного комара. Її тіло складається з двох відділів. Передній відділ яйцеподібної форми відповідає голові і грудям комахи; задній – звужений і членистий відповідає черевцю. У природному положенні черевце зігнуте, тому тіло лялечки за формою зазвичай порівнюють із комою (Рис. 8).




Рис. 8. Лялечка малярійного комара (*Anopheles* sp.):
А – вигляд збоку, Б – дихальна трубка (збільшено)

На спинній стороні переднього відділу лялечки розташовані парні дихальні трубки, через які повітря потрапляє в трахейну систему лялечки.

Розгляньте їх на великому збільшенні мікроскопа «МБР-1». Дихальна трубка має форму лійки – вузьку основу і широкий розтруб. На бічній поверхні середніх сегментів черевця, зазвичай з 3 по 7, розташовані масивні шипи, по одному з кожного боку сегменту. На кінці черевця є пара прозорих овальних хвостових плавців. У зрілих лялечок (вони відрізняються темним кольором), крізь покриви можна бачити частини дорослої комахи, що формується: очі, хоботок, вусики, крила, ноги.

Зарисуйте лялечку малярійного комара при вигляді збоку і збільшене зображення її дихальної трубки.

Робота 9. Вивчення фаз дозрівання яєць малярійних комарів (за Кристоферсом і Мером)

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» на великому збільшенні оваріоли комарів і встановіть фази дозрівання яєць (за Кристоферсом і Мером) на препаратах. Кожна яйцева трубочка (оваріола) складається із зони розмноження, розташованої у вузькій (проксимальній) її частини, і фолікулів, що розвиваються (у гоноктивних самок). Вся яйцева трубочка вкрита внутрішньою тонкою еластичною безструктурною мембраною — інтимою; на дистальному кінці інтима утворює вивідну частину, що називають кінцевою ніжкою. Окрім інтими, кожна яйцева трубочка оточена зовнішньою еластичною оболонкою. Фолікул містить 1 яйцеву клітину (ооцит), що перетворюється в яйце, і 7 живильних клітин, за рахунок яких здійснюється живлення яйця. Кожен фолікул оточений фолікулярним епітелієм, який закладається у момент відходження фолікула від зони розмноження. Фолікули, що відокремилися від зони розмноження, залишаються зв'язаними з нею тонкою стеблинкою. Одночасно в яйцевій трубочці можна бачити два фолікули, що відокремилися від зони розмноження; один значно більшого розміру, ніж інший. Це вказує на те, що перший раніше відокремився від зони розмноження.

Згідно Кристоферса і Мера у розвитку фолікулів виділяють 7 стадій (Рис. 9).




Рис. 9. Вигляд окремих яйцевих трубок *Anopheles maculipennis*:

А – перший фолікул – стадія I; другий – стадія N; Б – перший фолікул – стадія I-II; другий – стадія N; В – перший фолікул стадія II (початок), другий – стадія N; Г – перший фолікул – стадія II (кінець), другий – стадія N; Д – перший фолікул – стадія III (кінець), другий – стадія I; Е – перший фолікул – стадія IV (кінець), другий – стадія – I-II; Ж – перший фолікул – стадія V (кінець), другий – стадія II; 1 – яйцева клітка; 2 – живильні клітини; 3 – фолікулярний епітелій; 4 – зона розмноження; 5 – поплавці; 6 – розширення

Ці стадії характеризуються наступним чином:

N — фолікул складається з 8 недиференційованих клітин, має округлу форму. Фолікулярні клітини складають правильний кубічний епітелій.

I — добре помітна яйцева клітина, яка розташована в дистальній частині фолікула. Вище яйцевої клітини лежать 7 живильних клітин. Фолікул ще зберігає округлу форму або стає злегка овальним.

I—II — в протоплазмі яйцевої клітини з'являється навколо ядра вінець з 1—2 рядів жовткових зерен. Фолікул набуває овальної форми.

II — в протоплазмі яйцевої клітини навколо яйця розташовуються більші і численніші жовткові зерна. Яйце збільшується, стає значно більше живильних клітин і займає приблизно 1/2 фолікула.

III — яйце послідовно займає від 1/2 до 3/4 фолікула. Ядра його більше не помітно, оскільки воно приховане масою жовтка. Фолікул набуває дещо витягнуту форму.

IV — фолікул видовжується, живильні клітини займають лише верхню його частину. Заповнений жовтком ооцит сильно розвинений і займає більше 9/10 фолікула.

V — хоріон вкриває все яйце. Залишки живильних клітин опиняються в проксимальному кінці фолікула. Яйце готове до відкладання.

Зарисуйте згідно Кристофера і Мера фази дозрівання яєць комарів.

Лабораторна робота 9

ТЕМА: Особливості морфології і біології немалярійних комарів.

МЕТА: На прикладі комара звичайного та комара-пискуна ознайомитись з особливостями їх будови та розвитку.

ОБЛАДНАННЯ: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», тотальні препарати немалярійних комарів, мікропрепарати їх яєць, личинок, лялечок, ротових апаратів та таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика родини справжні комарі.
2. Загальна характеристика підродини Culicinae.
3. Морфологія імаго немалярійних комарів.
4. Морфологія личинок немалярійних комарів.
5. Морфологія лялечок немалярійних комарів.
6. Морфологія яєць немалярійних комарів.
7. Біологія немалярійних комарів та особливості їх живлення.

8. Особливості розвитку і розмноження немалярійних комарів.
9. Медико–ветеринарне значення немалярійних комарів.
10. Систематичний огляд немалярійних комарів, представники.
11. Боротьба з комарами.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Родина Комарі звичайні – Culicidae

Підродина Куліцинові – Culicinae

Комар-кусака двосмугий – Aedes communis

Комар-кусака каспійський – Aedes caspius

Комар-кусака мучитель – Aedes vexans

Комар-кусака плямистопинний – Aedes dorsalis

Комар звичайний – Culex pipiens

Комар скромний – Culex modestus

Мансонія ричарда – Mansonia richardii

Комар аляскинський – Culizeta alaskaensis

Комар кусачий – Culizeta morsitans

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови самок немалярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x і 2^x самок немалярійних комарів. Для імаго всіх родів немалярійних комарів характерно, що тергіти і стерніти черевця вкриті лусочками. Забарвлення лусочок є видовою ознакою. У *Culex pipiens* світлі жовтуваті лусочки утворюють перев'язі в передній частині кожного тергіту; остання частина кожного з тергітів вкрита темно-бурими лусочками. Задній кінець черевця закруглений, церок не помітно, що є відмітною ознакою роду *Culex* від видів іншого роду немалярійних комарів – *Aedes*.

У немалярійних комарів (*Culex*, *Aedes* та ін.) тіло «горbate», тобто голова з хоботком, груди і черевце утворюють ламану лінію, унаслідок чого комар ніби притискається до поверхні, розташовуючись приблизно паралельно відносно неї (Рис. 1).




Рис. 1. Немалярійний комар, самка: А – *Aedes caspius*, вигляд зверху; Б – положення при посадці: 1 – рід *Culex*; 2 – рід *Aedes*

Зарисуйте загальний вигляд комахи із спинної сторони. Також схематично нарисуйте положення самок немалярійних комарів при посадці.

Робота 2. Вивчення будови голів немалярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x і 2^x голови самців і самок немалярійних комарів. Немалярійних комарів легко відрізнити від комарів роду *Anopheles* за будовою щупиків. У самок немалярійних комарів (Рис. 2) щупики дуже короткі, в 4-7 разів коротші за хоботок, до основи якого вони прилягають. Вусики мають таку саму будову, як і у самок роду *Anopheles*. Вусики самців немалярійних комарів усаджені густими пучками довгих волосків (Рис. 2). Максилярні щупики самців, на відміну від малярійних комарів, довші за хоботок і не мають булавоподібного здуття в дистальній частині. У дистальній частині щупики вкриті довгими волосками. У самців *Culex* щупики значно довше за хоботок і зовсім не потовщені. У самців *Aedes* щупики лише трохи перевищують довжину хоботка; кінець третього членика, четвертий і, особливо, п'ятий членики щупиків утворюють нерізно виражені окремі потовщення.

Зарисуйте загальний вигляд голів самців і самок немалярійних комарів.
Позначте хоботки, вусики та щупики.




Рис. 2. Голови немалярійних комарів р. *Culex*: А – самка, Б – самець:
1 – вусик, 2 – максиллярний щупик, 3 – хоботок, 4 – око

Робота 3. Вивчення будови щитка самки немалярійного комара

Під мікроскопом «МБР-1» на великому збільшенні розгляньте верхню задню частину середньогрудей самки малярійного комара і знайдіть щиток. Задній край щитка, на відміну від *Anopheles*, трилопатовий (Рис. 3). Волоски щитка утворюють три пучки, відповідно його лопатям.

Зарисуйте щиток самки немалярійного комара.




Рис. 3. Будова щитка немалярійного комара підродини *Culicinae*

Робота 4. Вивчення будови крила самки немалярійного комара

На великому збільшенні мікроскопа «МБР-1» розгляньте тотальний мікропрепарат крила немалярійного комара. Крило має овально-трикутну форму. Пластинка крила вкрита дрібними волосками. Лусочки сконцентровані вздовж жилок. Плям на крилах немає. У немалярійних комарів, на відміну від роду *Anopheles*, остання з радіальних жилок (найкоротша поздовжня жилка, що відходить від вершини крила) впирається радіомедіальну поперечну жилку і не перетинає її (Рис. 4).

Зарисуйте крило немалярійного комара та область поперечних жилок, позначте поздовжні та поперечні жилки.




Рис. 4. Крило немалярійного комара: А – жилкування крила, Б – область поперечних жилок немалярійного комара (збільшено). Жилки: 1 – костальна; 2 – субкостальна; 3-5 – перша-четверта радіальні; 6 – задня радіальна; 7-8 – передня і задня медіальні; 9-10 – передня і задня кубітальні; 11 – анальна; 12 – радіомедіальна (передня поперечна); 13 – медіально-кубітальна (задня поперечна)

Робота 5. Вивчення будови яєць і яйцекладок різних видів немалярійних комарів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x яйця різних комарів родів *Culex* та *Aedes*. У комарів-піскунів роду *Culex* яйця, відкладені за один раз у кількості 60-300 штук, склеєні вертикально один з одним на зразок човника (Рис. 5). Комарі-кусаки роду *Aedes* відкладають яйця поодиноці, як малярійні комарі, але в більшості випадків не у воду, а на поверхню ґрунту по краях водойм.

На малому збільшенні мікроскопа розгляньте окремі яйця. Окреме яйце комара-піскуна має подовжену форму, із закругленими кінцями; один — ширший і тупіший, інший — вужчий. На нижньому кінці яйця є кришечка. У комарів-кусак яйця мають видовжено-овальну форму, хоріон має певну мікроскульптуру (Мал.5).

Зарисуйте зовнішній вигляд яєць та яйцекладок розглянутих видів немалярійних комарів.




Рис. 5. Яйця комарів: А – роду *Culex*; Б – роду *Aedes*: 1 – «човник» зі склесених яєць (вигляд зверху), 2 – те саме збоку, 3 – яйце збоку, 4 – кладка яєць, 5 – яйце збоку

Робота 6. Вивчення зовнішньої будови личинок немалярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинок IV віку немалярійних комарів підродина Culicinae. Форма голови поперечно-овальна: ширина більше довжини. Зірчасті волоски черевця відсутні. На передостанньому сегменті черевця помітно щітки (парні утворення), що складаються з численних лускоподібних зубців, розташованих в декілька рядів. Від передостаннього сегменту черевця під кутом відходить дихальна трубка, або сифон, завдяки чому задній кінець личинки здається подвоєним (Рис. 6). Наявність сифона дозволяє легко відрізнити личинок всіх видів немалярійних комарів від позбавлених сифона личинок роду *Anopheles*. У личинок стигми знаходяться на вершині сифона і збоку не помітні. У проксимальній третині сифона розташовується два ряди зубців, які створюють гребінь сифона. У серединній і дистальній третинах сифона на його вентральній поверхні може знаходитися до декількох пар пучків волосків. На останньому сегменті знаходиться плавець і досить довгі, звужені до вершини анальні зябра.

Зарисуйте личинку IV віку немалярійного комара зі спинного боку і позначте деталі її будови.




Рис. 6. Личинка немалярійного комара підродини Culicinae IV віку:

А – вигляд із спинної сторони, Б – схема розташування личинки у воді під час живлення: 1 – антена, 2 – бічні лопаті верхньої губи («віяла»), 3 – голова, 4 – око, 5 – груди, 6 – черевце, 7 – сифон, 8 – стигмальна пластинка, 9 – анальні зябра, 10 – плавець

Робота 7. Вивчення зовнішньої будови лялечок немалярійних комарів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x лялечки різних видів немалярійних комарів. Лялечка немалярійного комара відрізняється від лялечок комарів роду *Anopheles* відсутністю шипів з боків сегментів черевця і формою дихальних трубок: вони мають вигляд не лійок, а досить довгих трубок, що закінчуються відносно невеликими отворами (Рис. 7). Розгляньте дихальні трубки немалярійного комара на великому збільшенні мікроскопа «МБР-1».

Зарисуйте одну з лялечок немалярійних комарів при вигляді збоку і окремо збільшене зображення її дихальної трубки.




Рис. 7. Лялечка немалярійного комара: А – лялечка комара роду *Aedes*, вигляд збоку, Б – дихальна трубка лялечки комара роду *Culex*

Лабораторна робота 10

Тема : Особливості морфології і біології мокреців та москітів.

Мета: На прикладі мокреців та москітів ознайомитись з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», тотальні препарати і мікропрепарати мокреців та москітів, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика підродини Phlebotominae.
2. Систематичний огляд москітів, найважливіші види.
3. Морфологія москітів.
4. Біологія та особливості живлення москітів.
5. Особливості розвитку і розмноження москітів.
6. Медико-ветеринарне значення москітів.
7. Загальна характеристика родини Ceratopogonidae.
8. Систематичний огляд мокреців, найважливіші види.
9. Морфологія мокреців.
10. Біологія та особливості живлення мокреців.
11. Особливості розвитку і розмноження мокреців.
12. Медико-ветеринарне значення мокреців.
13. Заходи боротьби з мокрецями та москітами.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Підряд Довговусі двокрилі – Nematocera

Родина Метелівкові – Psychodidae

Підродина Москіти – Phlebotominae

Москіт папатачний – *Phlebotomus papatasi*

Родина мокреці (Ceratorogonidae)

Мокрець звичайний – *Culicoides punctatus*

Мокрець білокрилий – *Culicoides vexans*

Мокрець плямистий – *Culicoides nubeculosus*

Мокрець дупловий – *Culicoides fagineus*

Лептоконопс північний – *Leptoconops borealis*

Форціномія сибірська – *Forcipomyia sibirica*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови імаго москітів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1^x тотальні препарати самки і самця москітів. Комахи орієнтують ногами назад.

Невеличка голова несе 16-членикові вусики і розвинений колочо-сисний хоботок. Дорзальна і бічні поверхні голови несуть дрібні волоски. Груді добре розвинені і вкриті пучками рудих волосків. Границі між грудними сегментами погано розрізняються. На дорзальній поверхні грудей, ближче до черевця, помітний виступ, який звернений вершиною назад. Це щиток середньогрудей. Із боків середньогрудей прикріплені гострокінцеві крила, вкриті волосками. З черевної сторони грудного відділу до кожного сегменту прикріплена пара довгих ніг, вкритих волосками. Межа між грудьми та черевцем – чітка. Черевце складається з 7 чітких сегментів, що вкриті численими волосками (Рис. 1). Самець москіта відрізняється від самки наявністю на кінці черевця зовнішнього копулятивного апарату. На тотальному препараті просвічуються деякі внутрішні органи. У грудях – це грудні м'язи. У черевці також помітні різні внутрішні органи: шлунок, мальпігієві судини (розташовані з боків шлунка у вигляді світло-зернистих стрічок), яєчник.

Зарисуйте загальний вигляд самки і самця москіта.




Рис 1. Зовнішній вигляд москіта папатачного *Phlebotomus papatasi*:
А – самець, Б – самка

Робота 2. Вивчення будови голови та ротового апарату самки москіта *Phlebotomus papatasi*

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні голову самки москіта роду *Phlebotomus*.

Очі займають більшу частину голови, великі, чорні, заокруглені. Вусики – довгі, ниткоподібні, прикріплені перед очима, щільно вкриті волосками різної довжини і парними колінчастими шипами (з 13 по 15 членик). Передній кінець голови переходить валикоподібне лице (кліпеус). Із вентрального боку до нього прилягає хоботок, який складається з нижньої губи – м'язового органу з жолобком на дорзальній поверхні, де знаходяться колючі частини ротового апарату. Членисті, густо вкриті волосками, дещо вигнуті п'ятичленикові утвори, що розташовані над хоботком, – нижньощелепні щупики. У голові позаду очей, на великому збільшенні, можна побачити контури глотки, яка має грушоподібну або пляшкоподібну форму. На розширеній частині основи глотки розгляньте шипувате поле, де зосереджені кутикулярні складки, шипики і лусочки.

Зарисуйте загальний вигляд голови самки москіта. Позначте хоботок, лице, очі, глотку, вусики та щупики. Окремо розгляньте і зарисуйте на великому збільшенні ($280\times$) глотку, де позначте шипувате поле.




Рис 2. Голова самки москіта папатачного (*Phlebotomus papatasi*):

А – загальний вигляд голови, вигляд зверху; Б – глотка (збільшено): 1 – вусик, 2 – нижньощелепний щупик, 3 – хоботок, 4 – кліпіус, 5 – око, 6 – глотка, 7 – шипувате поле

Робота 3. Вивчення будови крила москіта роду *Phlebotomus*

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні крило москіта роду *Phlebotomus*. Крило москітів роду *Phlebotomus* має більш-менш овальну форму (Рис. 3).




Рис 3. Крило москіта папатачного (*Phlebotomus papatasi*): Жилки: 1 – костальна, 2 – субкостальна, 3-7 – радіальні, 8-11 – медіальні, 12 – кубітальна

Особливість жилкування крила – подвійна біфуркація другої поздовжньої жилки. Крило оторочує костальна жилка. Нижче паралельно до неї йде субкостальна жилка, її довжина не перевищує 1/3 переднього краю крила. З основи крила починається проста перша радіальна жилка крила. За нею йде друга радіальна жилка від якої відгалужуються третя і четверта радіальні. П'ята радіальна жилка проста, вона не галузиться. Четверта поздовжня жилка розділяється в середній частині крила на першу медіальну і другу медіальну. Третя і четверта медіальні жилки – прості. Біля основи крила

помітна дуже коротка кубітальна жилка. У проксимальній частині крила помітні дві невеликі поперечні жилки.

Зарисуйте крило москіта і позначте його поздовжні жилки.

Робота 4. Вивчення яєць москітів роду *Phlebotomus*

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні (70^x) яйця москітів роду *Phlebotomus*. Вони мають видовжено-овальну форму. Одна сторона більш сплюснена, інша більш випукла. Обидва полюси заокруглені. Колір яєць темно-коричневий. Довжина яєць 0,35-0,38 мм. На оболонці помітний своєрідний сітчастий рисунок (Рис. 4).

Зарисуйте зовнішній вигляд яйця москіта.




Рис. 4. Яйця москітів: 1 – *Ph. papatasi*, 2 – *Ph. sergenti*

Робота 5. Вивчення зовнішньої будови личинок москітів старшого віку роду *Phlebotomus*

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинку москіта IV віку роду *Phlebotomus*. Вона не забарвлена. Голова добре відокремлена, вкрита коричневим хітином. Очей немає. Груді містять 3 сегменти, а черевце 9 сегментів. На кінці черевця розташовані 4 хвостові нитки (Рис. 5). Вздовж всього тіла тягнеться трубка, яка заповнена зернистою масою. Це кишковий канал личинки.

Зарисуйте загальний вигляд (збоку) личинки IV віку.




Рис 5. Личинка москіта роду *Phlebotomus* VI віку, вигляд збоку: 1 – голова, 2 – груді, 3 – черевце, 4 – хвостові нитки

Робота 6. Вивчення зовнішньої будови лялечки москіта р. *Phlebotomus*

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» лялечку москіта роду *Phlebotomus* при збільшенні 2х. Вона не забарвлена. Передній кінець її широкий. Груді випинаються у вигляді горба. Над ними помітна голова з очима, які формуються. Вентрально до грудей та голови примикають видовжені пластинки (місце формування вусиків, ніг, крил). Черевце – найбільш вузька частина. Воно вигнуте. На його кінці прикріплений екзувій личинки 4-ї стадії (Рис. 6).

Зарисуйте загальний вигляд лялечки москіта (збоку) і позначте деталі її будови.




Рис. 6. Лялечка москіта роду *Phlebotomus*, вигляд збоку:
1 – голова, 2 – груді, 3 – черевце, 4 – екзувій

Робота 7. Вивчення зовнішньої будови мокреця роду *Culicoides*

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x тотальний мікропрепарат самки мокреця роду *Culicoides*. Тіло цієї комахи чітко поділене на голову, груді та черевце. Голова гіпогнатична і має пару 15-членикових вусиків. Фасеткові очі ниркоподібної форми. На препараті можна роздивитись такі частини грудей: середньоспинку, що займає більшу частину дорзальної поверхні грудного відділу (складається з передщитка, щитка та щитика), маленьку передньоспинку, епімери та епістерни передньо-, середньо- та задньогрудей. З боків середньогрудей прикріплена 1 пара крил. Ноги стрункі, складаються з тазика, овороті, стегна, гомілки та лапки. Черевце складається з 10 сегментів, кожний з яких поділяється на тергіт та стерніт.

Зарисуйте загальний вигляд мокреця (збоку). Позначте структури зовнішньої будови.




Рис 7. Самка *Culicoides*, загальний вигляд:

А – *C. nubeculosus* у спокої, Б – *C. nubeculosus* з розправленими крилами, В – *C. palmerae*: 1 – хоботок, 2 – щупик, 3 – вусик, 4 – голова, 5 – фасеткове око, 6 – груди, 7 – крило, 8 – дзизкальце, 9 – черевце, 10 – ноги

Робота 8. Вивчення будови крила мокреця роду *Culicoides*

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x крило мокреця роду *Culicoides*. Жилкування крил має істотне значення в систематиці цих комах. Крила несуть основні повздовжні жилки: костальну, субкостальну, медіальну, кубітальну і рудиментарну анальну. Між радіальною та медіальною є поперечна жилка. Крилова пластинка вкрита дуже дрібними мікротріхіями і більш крупними волосками. На крилах деяких видів є пігментні плями, які утворюють характерний рисунок.

Зарисуйте будову крила мокреця роду *Culicoides* і вкажіть його основні жилки та комірки.




Рис 8. Схема жилкування крила мокреця роду *Culicoides*:

Жилки: 1 – поперечна плечова, 2 – поперечна радіомедіальна, 3 – костальна, 4 – медіальні, 5 – кубітальні. Комірки: 6 – базальна 7 – перша радіальна, 8 – друга радіальна, 9 – п'ята радіальна, 10 – перша медіальна, 11 – друга медіальна, 12 – кубітальна, 13 – анальна

Робота 9. Вивчення будови кінцівки мокреця роду *Culicoides*

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» при збільшенні 4^x дистальну частину кінцівки мокреця. На вершині останнього членика лапки розташована пара кігтиків. Пульвіли відсутні. Емподій (у вигляді перистого волоска чи пластинки) є не у всіх представників родини. Якщо він є відмітьте його форму (Рис. 9).

Зарисуйте кінцівку мокреця роду *Culicoides* і останній членок лапки. На нозі позначте частини кінцівки, а на лапці кігтики та емподій.




Рис. 9. Будови кінцівки мокреця роду *Culicoides*:

А – загальна будова задньої ноги, Б – останній членок лапки самки:

1 – тазик, 2 – вертлюг, 3 – стегно, 4 – гомілка, 5 – лапка, 6 – емподій, 7 – кігтики

Робота 10. Вивчення будови преімагінальних фаз розвитку мокреця роду *Culicoides*

Розгляньте під мікроскопом «МБР-1» на малому збільшенні яйця мокреця роду *Culicoides*. Вони мають видовжену, овальну, злегка вигнуту форму (Рис. 10). Довжина яєць коливається у різних видів (0,27-0,46 мм). Поверхня оболонки яйця вкрита дрібними горбиками. Забарвлення яєць може змінюватись від брудно-білих (після відкладки) до темно-коричневого (в зрілих). Зарисуйте загальний вигляд яйця мокреця.




Рис. 10. Преімагінальні фази розвитку мокреців роду *Culicoides*:

А – яйце, Б – личинка мокреця, В – лялечка мокреця

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинку мокреця роду *Culicoides* IV віку. Вона червоподібної форми, з добре відокремленою головою без придатків (Рис. 10).

Зарисуйте загальний вигляд личинки мокреця зверху.

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x зверху лялечку мокреця роду *Culicoides*. Вона видовжена, чітко помітні голова і груди. Черевце поділене на сегменти (Рис. 10).

Зарисуйте загальний вигляд лялечки мокреця.

Лабораторна робота № 11

Тема: Особливості морфології і біології мошок.

Мета: На прикладі мошок ознайомитись з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати яєць, личинок, лялечок та імаго мошок, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика родини Simuliidae.
2. Систематичний огляд мошок, представники.
3. Морфологія мошок.
4. Біологія та особливості живлення мошок.
5. Особливості розвитку і розмноження мошок.
6. Мошки – кровососи людини та тварин, контроль чисельності.
7. Мошки – переносники збудників захворювань.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Підряд Довговусі двокрилі – Nematocera

Родина Мошки – Simuliidae

Мошка золотиста – *Eusimulium aureum*

Мошка волинська – *Nevermannia volhynica*

Мошка тундрова – *Schoenbaueria pusilla*

Мошка чорна – *Schoenbaueria nigra*

Мошка червоноголова – *Boopthora erythrocephala*

Мошка прикрашена – *Odagmia ornata*

Мошка кінська – *Wilhelmia equina*

Мошка річкова – *Simulium reptans*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови імаго мошок

Розгляньте імаго мошок під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x.




Рис. 1. Загальний вигляд імаго мошок: А – самка, збоку, Б – самець, зверху

Ці комахи мають дрібні розміри (2–6 мм). Забарвлення тіла чорне, іноді з сріблястими плямами на спині і ногах. Їхнє тіло розділене на три відділи: голову, груди і черевце (Рис. 1).

Голова – округла, стиснута в передньо-задньому напрямку і злегка підігнута під груди. По боках голови знаходяться великі очі, розділені попереду в самки лобом, а в самця – лобним швом. Очі самців спереду розділені лобним швом і розділяються горизонтально на дві частини: верхню – з великими омаїдіями і нижню – з дрібними омаїдіями. Очі самок складаються з фасеток однакових розмірів. Груді неправильно-округлої форми, зверху спинка опукла, часто зі сріблястим нальотом. Крила широкі і прозорі, прикріплені до верхньої частини середньогрудей. Ноги короткі, товсті, з сильно розвиненими першими члениками лапок. Черевце довгасто-овальне, звужене до кінця, складається з 11 сегментів. З боків 2–7 тергітів є

дихальця. У кровосисних видів 2–7 стерніти черевця вкорочені. У самок 8–11-й сегменти, а у самців – 9–11-й видозмінені й перетворені на статеві придатки.

Зарисуйте загальний вигляд імаго мошок: самки (вигляд збоку) та самця (вигляд із спинної сторони).

Робота 2. Будова голови і ротового апарату самки мошки

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x голову самки мошки.

Голова самки має округлу форму. Лице злегка опукле, має вигляд неправильного чотири- або п'ятикутника. Нижче лоба розташовані короткі товсті 11-членикові вусики, що поступово звужуються до вершини. Ротові придатки складаються з хоботка ріжучого типу, розташованого на нижній стороні голови; по сторонах від нього є щупики (Рис. 2).




Рис. 2. Голова самки мошки та її придатки:

1 – лоб; 2 – вусик; 3 – складне око; 4 – лице; 5 – максилярний щупик; 6 – максила; 7 – нижня губа; 8 – верхня губа; 9 – підглотівник; 10 – мандибула

Хоботок складається з верхньої губи, надглотівника, двох пар верхніх і нижніх щелеп, підглотівника і нижньої губи. Мандибули і максили у кровосисних самок мають дрібні зубці. Між мандибулами і максилами розташований непарний склерит – підглотівник, на поверхні якого є широкий жолобок, що разом із жолобком верхньої губи утворює ротоглотковий канал. Нижньощелепні щупики – 4-членикові.

Зарисуйте будову голови самки мошки. Позначте деталі будови голови та ротового апарату.

Робота 3. Вивчення будови крила мошок

Розгляньте препарат крила мошки під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $4\times$. Крила мошок опукло-овальної форми, з поздовжнім жилкуванням, поперечних жилок майже немає (Рис. 3). По передньому краю не досягаючи вершини тягнеться костальна жилка, за нею йде субкостальна, далі – дві або три радіальні. Середину крила займають дві медіальні жилки, за ними – дві кубітальні. У задній частині крила розташовані анальна й аксиллярна жилки. При розрізненні видів враховується характер галуження і хетотаксія.

Зарисуйте схему будови крила мошки і позначте його основні жилки.




Рис. 3. Будова крила мошки роду *Simulium*: А – ділянка костальної жилки крила; Б – крило: 1 – шипики, 2 – волоски, 3 – костальна жилка, 4 – поперечна жилка, 5 – субкостальна жилка, 6 – перша радіальна жилка, 7 – друга-третья радіальна жилка, 8 – перша медіальна жилка, 9 – друга медіальна жилка, 10 – складка на крилі, 11 – перша кубітальна жилка, 12 – друга кубітальна жилка, 13 – анальна жилка, 14 – аксиллярна жилка

Робота 4. Вивчення будови лапок самок мошок

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $4\times$ лапки самок мошок (Рис. 4). Перший членик передніх лапок (базитарзус) циліндричний або розширений донизу, на середніх лапках він коротший, ніж інші; на задніх лапках – довгий, розширений донизу. На

дистальному кінці першого членика задніх лапок із внутрішньої сторони є виріст, що називається кальціпалою. Другий членик задніх лапок поблизу проксимального кінця має вирізуку (педисулькус) різної глибини. Кігтики самок різної форми, можуть бути довгими або короткими, з великим чи дрібним зубцем біля основи або без зубця.

Зарисуйте зовнішній вигляд задньої лапки самки мошки. Позначте деталі її будови.




Рис. 4. Задня лапка самки мошки:

1 – базитарзус; 2 – кальціпала; 3 – педисулькус; 4 – кігтик

Робота 5. Вивчення будови яєць мошок

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 4^x, або на малому збільшенні мікроскопа «МБР-1» яйця мошок з родів: *Odagmia*, *Simulium* або *Eusimulium*. Форма яєць мошок опукло-трикутна або злегка овально-витягнута (Рис. 5). Оболонка яєць гладка, прозора. Щойно відкладені яйця білувато-матові, зрілі – світло-коричневі.

Зарисуйте зовнішній вигляд яйця мошки.




Рис. 5. Яйце мошки роду *Simulium*

Робота 6. Вивчення зовнішньої будови личинки мошки

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинку мошки старшого віку. Її тіло червоподібне з потовщеним грудним відділом і дистальним кінцем черевця. Забарвлення різних видів варіює від зеленувато-жовтого до темно-коричневого. Голова велика, злегка нахилена вниз, сильно хітинізована, має розвинені антени і ротові придатки циліндричної форми. На лобному склериті є рисунок із темних плям, притаманний певним видам. Личинки мошок мають характерні бічні вирости верхньої губи («віяла»). З вентральної сторони

грудей розташована непарна «нога», яка містить на кінці кільце гачків. У зрілих личинок по сторонах грудей під зовнішніми покривами розташовані дихальні нитки майбутньої лялечки. На задньому кінці черевця попереду від анального отвору знаходиться задній прикріплювальний орган, що складається з численних гачечків і має попереду хітинову раму (Рис. 6).

Зарисуйте загальний вигляд личинки мошки (збоку). Позначте структури зовнішньої будови.




Рис. 6. Личинка мошки, вигляд збоку:

1 – «віяла», 2 – антена, 3 – лобний склерит, 4 – дихальні нитки, 5 – хітинова рама, 6 – віночок гачечків, 7 – грудна «нога», 8 – ротовий апарат

Робота 7. Вивчення зовнішньої будови лялечки мошки

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x лялечку мошки.

Лялечка (Рис. 7) знаходиться в коконі, який прикріплюється до субстрату. Передній край кокона відкритий, з нього висуваються дихальні нитки. На тілі лялечки, на плечових полях, розташовуються дихальні органи, що являють собою сукупність тонких дихальних трубочок – ниток, які з'єднуються біля основи різними способами. Кількість дихальних ниток, характер їхнього галуження, а також бляшки, волоски і трихоми в основі ниток мають значення в систематиці. На черевці лялечки з дорсальної і вентральної сторін розташовані ряди шипиків, хет і волосків. На кінці черевця є ряди гачків, іноді сильно закручених або якореподібних, що служать для утримання лялечки в коконі.

Зарисуйте загальний вигляд лялечки мошки без кокона (збоку).




Рис. 7. Загальний вигляд лялечки без кокона, вигляд збоку:

1 – дихальний орган, 2 – голова, 3 – груди, 4 – черевце, 5 – якореподібні гачки

Робота 8. Вивчення коконів лялечок мошок

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x кокони різних видів мошки. Форма і будова кокона у різних мошок має відмінності. Зазвичай кокон має вигляд хатинки. У одних видів передній край такого кокона товстий і утворює кантик. Інколи на передньому краю можуть утворюватись виступи у вигляді рога. Трапляються кокони з комірцем, тобто коли нижні передньо-бічні краї кокона стуляються, утворюючи так званий черевикоподібний, або, якщо комірець високий – чоботоподібний кокон. Стінки кокона мають різну будову. У деяких видів кокони з боків бувають з отворами або без них, в інших – передній край може бути пухким, сплетеним з окремих петель, що йдуть у різних напрямках.

Зарисуйте і позначте кокони лялечок мошок різної форми.




Рис. 8. Форма і будова кокона: 1 – простий; 2 – із рогоподібним виростом; 3 – черевикоподібний; 4 – чоботоподібний

Лабораторна робота № 12

Тема: Особливості морфології і біології гедзів.

Мета: На прикладі гедзів ознайомитися з особливостями їх будови та розвитку.

Обладнання: мікроскопи «МБС-10», «МБР-1», мікропрепарати та тотальні мікропрепарати імаго, яєць, личинок та лялечок гедзів, таблиці.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика ряду гедзі.
2. Систематичний огляд гедзів, представники.
3. Морфологія гедзів.
4. Біологія гедзів і приуроченість їх до живителів.
5. Особливості розвитку і розмноження гедзів.
6. Гедзі – паразити людини та тварин.
7. Гедзі переносники інфекційних хвороб.
8. Заходи контролю за чисельністю гедзів.

Класифікація

Ряд Двокрилі – Diptera

Підряд Коротковусі двокрилі – Brachicera

Родина Гедзі – Tabanidae

Пістряк болотний – *Chrysops divaricatus*

Пістряк оздоблений – *Chrysops pictus*

Гедзь бичачий – *Tabanus bovinus*

Гедзь сірий – *Tabanus bromius*

Гедзь темно-сірий – *Tabanus maculicornis*

Гібомітра рання – *Hybomitra conformis*

Дощовиця звичайна – *Haematopota pluvialis*

Хід роботи

Робота 1. Вивчення зовнішньої будови гедзів різних видів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $0,6^x$ і 1^x самок гедзів різних видів. Тіло гедзів чітко поділене на три відділа: голову, груди та черевце. Вони мають середні або великі розміри, їх довжина може сягати 2,5 см, а розмах крил до 6,5 см (Рис. 1). Зазвичай гедзі мають темне забарвлення, але на черевці або грудях можуть бути різні смужки чи плями, і навіть великі очі гедзів, можуть бути забарвлені. При диференціації основних родів велике значення має забарвлення крил. У гедзів роду *Tabanus* крила світлі або коричневі, тоді як у *Haematophora* вони строкаті, а у *Chrysops* є темні смуги.




Рис. 1. Загальний вигляд самок гедзів: А – *Chrysops relictus*, Б – *Nybomitra tarandina*, В – *Haematopota pluvialis*, Г – *Tabanus bovinus*

При диференціації треба також звернути увагу на особливості будови коротких, товстих трисегментних вусиків, на яких відсутній остюк, що відрізняє гедзів від великих мух підряду *Cyclorhapha*. Груди добре розвинені. До них з боків прикріплена 1 пара широких крил, а знизу – три пари ніг.

Черевце широке, стиснуте зверху вниз, складається з семи пар видимих півкілець. На кожному сегменті черевця на інтерсегментальній перетинці є одна пара стигм. У самців черевце конічне, у самок – округле.

Зарисуйте загальний вигляд самок гедзів із спинної сторони.

Робота 2. Вивчення зовнішньої будови голови самок гедзів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $1\times$ і $2\times$ голови самок справжніх гедзів та пістряків. Голова гедзів гіпогнатичного типу. Більшу її частину займають добре розвинуті фасеткові очі. У деяких видів на очах є більш-менш чітко виражені поперечні смужки. Крім фасеткових очей у деяких гедзів є по три простих вічка, розташованих на тім'ї, у інших видів вони редуковані до очного горбика. У самок складні очі поділяються лобною смужкою. На ній часто є блискучі чорні ділянки оголеного хітину – так звані мозолі. У пістряків та дощовиць є по одній мозолі, а у більшості інших родів їх може бути по дві: нижньолобна та середньолобна. Частина голови, що розташована нижче місця прикріплення вусиків, називається лице. У багатьох видів воно покрите матовим нальотом і волосками. У деяких видів

(рід *Chrysops*) на його опуклій середній частині є добре розвинені ділянки опуклого і блискучого хітину — лицеві мозолі (Рис. 2).

Зарисуйте загальний вигляд голови самки гедзя (спереду). Позначте структури зовнішньої будови.




Рис. 2. Будова голови самки гедзя): А – голова *Chrysops caecutiens*, спереду; Б – фрагмент голови *Tabanus sp.*: 1 – вічка, 2 – лобна мозоля, 3 – фасеткове око, 4 – вусикова ямка, 5 – лицева мозоля, 6 – лице, 7 – нижньощелепні щупики, 8 – хоботок, 9 – щочна мозоля, 10 – верхня лобна мозоля; 11 – очний горбик; 12 – лобна смужка, 13 – нижня лобна мозоля, 14 – лобний трикутник

Робота 3. Вивчення будови вусиків самок гедзів

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x вусики самок справжніх гедзів та пістряків. Вусики у гедзів зближені основами, короткі і виразно розділені на три членика (Рис. 3).

Перший та другий членики утворюють основну частину вусика, третій (тобто кінцевий) членик найдовший. Він поділений на декілька вторинних члеників. Базальний членик зазвичай сплюснутий з боків і видовжений, тоді як маленькі кінцеві членики мають більш-менш циліндричну форму і сукупно утворюють так звану паличку. У рода *Tabanus* основа третього членика найширша, має вигляд видовженої плоскої структури (площинка) з виступом на верхній стороні (дорзальним кутом).

Зарисуйте загальний вигляд вусиків гедзя. Позначте деталі їх будови.




Рис. 3. Вусики самок гедзів: А – *Tabanus*; Б – *Chrysops*; В – *Haematopota*: 1 – перший членик, 2 – другий членик, 3 – площинка, 4 – дорзальний кут, 5 – паличка

Робота 4. Вивчення ротового апарату самки гедзя

Розгляньте «МБС-10» при збільшенні 1^x мікропрепарат ротових органів самки гедзя. Хоботок гедзя складається з масивної, м'якої, чорної нижньої губи, в жолоб якої укладений міцний, хітиновий колючо-ріжучий апарат (Рис. 4). Нижня губа на вільному кінці розділяється на дві широкі лопаті, які з внутрішньої сторони мають покресленість із паралельних поперечних жолобків (псевдотрахеї). Колючий апарат складається з шести тонких, стилетоподібних, коричневих пластинок: жолобоподібної верхньої губи, пари шаблеподібних верхніх щелеп, пари тонких нижніх щелеп із двочлениковими нижньощелепними щупиками і вузького підглотівника, пронизаного слинною протокою.




Рис. 4. Ротовий апарат самки *Tabanus* sp.: А – зовнішній вигляд; Б – відокремлені ізольовані ротові частини: 1 – гіпофаринкс, 2 – нижня губа, 3 – верхні щелепи, 4 – нижні щелепи, 5 – верхня губа, 6 – кардо, 7 – стіпес, 8 – нижньо-щелепний щупик, 9 – лице, 10 – ріжуча частина хоботка прикрита верхньою губою

Зарисуйте зовнішній вигляд ротового апарату та ізольовані ротові частини самки гедзя. Позначте їх.

Робота 5. Вивчення зовнішньої будови крила гедзя

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 1х крило гедзя.

Крила широкі, з більш-менш одноманітним жилкуванням (Рис. 5). Розрізняють такі поздовжні жилки: костальну, субкостальну, чотири радіальні, три медіальні, кубітальні і анальну. Між п'ятою радіальною і першою медіальною є коротка поперечна радіально-медіальна жилка. Крім того, третя по рахунку радіальна жилка в місці вигину часто має невелику додаткову жилку, направлену до основи крила. Перераховані жилки утворюють на крилі наступні комірки: костальну, субкостальну, три радіальні, дві базальні (верхня і нижня базальні комірки), дискоїдальну, п'ять задньокрайніх і анальну. Біля основи крила знизу є добре помітне крильце (*allula*) і пара закрилових пластинок, що налягають одна на одну. Забарвлення крил гедзів безбарвне, з темними смугами і плямами, або сіре зі світлим сітчастим рисунком (мармурові).

Зарисуйте крило гедзя і позначте його основні жилки та комірки.




Рис. 5. Будова крила гедзя.

Жилки: 1 – костальна, 2 - субкостальна, 3-6 – радіальні, 7-9 – медіальні, 10 – перша кубітальна, 11 - анальна + друга кубітальна, 12 – придатак четвертої радіальної жилки, 13 - радіомедіальна. Комірки: 14-15 – радіальні, 17-21 – задньокрайні, 22 - анальна, 23 – передня базальна, 24 – задня базальна, 25 – дискоїдальна, 26 – костальна, 27 – субкостальна

Робота 6. Вивчення будови кінцівки гедзя

Розгляньте під мікроскопом «МБС-10» кінцівки гедзів при збільшенні 4^x.

Ноги гедзів помірної довжини, покриті волосками, без грубих щетинок. Кожна нога складається з 5 основних частин: тазика, вертлюга, стегна, гомілки і п'ятичленикової лапки. На кінці останнього членика лапки є пара міцних кігтиків і під ними три добре розвинених присоска: бічні – пульвіли і розташований між ними емподій (Рис. 6). Зазвичай, гомілки середньої пари ніг на кінці мають пару міцних щетинок, так званих шпор. У деяких видів гедзів шпори є і на задніх гомілках.

Зарисуйте вигляд дистальної частини задньої лапки гедзя і позначте елементи її будови.




Рис. 6. Будова задньої кінцівки гедзя (*Chrysops*):

А – загальний вигляд; Б – останій членик лапки: 1 – лапка, 2 – гомілка, 3 – стегно, 4 – шпори, 5 – кігтик, 6 – емподій, 7 – пульвіла

Робота 7. Вивчення будови кладки яєць гедзів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x яйця та яйцекладки гедзів. Форма яєць гедзів вузько-циліндрична, з помітним звуженням на передньому кінці. На обох кінцях яйце навскіс зрізане. Розміри яєць гедзів роду *Tabanus*: завдовжки – 1,8-2 мм, завширшки – 0,3-0,4 мм.

У багатьох видів трапляються кладки яєць у вигляді компактної купки з 3–4 шарів яєць розташованих один над іншим і склеєних між собою (Рис. 7).

Зарисуйте кладку яєць гедзів.




Рис. 7. Кладка яєць гедзів *Tabanus autumnalis*

Робота 8. Вивчення будови личинок гедзів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні 2^x личинку гедзя. Тіло личинки вузьке, веретеноподібне, із загостреними кінцями, в поперечному перетині кругле або злегка стиснуте у дорзо-вентральному напрямку, складається з 11 виразно розділених сегментів (3 грудних і 8 черевних), маленької чорної голови і дихальної трубки (Рис. 8). Навколо сегментів добре помітні рельєфні кільця. Довжина личинки гедзя становить 1,0–6,0 см.

Голова личинки витягнута в трубку і сильно хитинізована. На її передньому кінці розташований ротовий апарат, який складається з гачкуватої, сильно сплющеної з боків верхньої губи; пари тонких, зігнутих і сильно загострених верхніх щелеп; пари ширших в основі і менш хитинізованих нижніх щелеп і роздвоєної на кінці нижньої губи (Рис. 8).

Задньо-верхня частина анального сегменту витягнута у вузьку дихальну трубку (сифон) і несе на кінці вертикальну щілину, в якій розміщуються дві стигми, сполучені між собою.

Зарисуйте зовнішній вигляд личинки гедзя та її голову і позначте деталі будови.




Рис. 8. Личинка гедзя: А – голова; Б – загальний вигляд: 1 – око, 2 – площадка з шипиками, 3 – вусик, 4 – верхня губа, 5 – нижня губа, 6 – нижньощелепні щупики, 7 – верхня щелепа, 8 – нижня щелепа, 9 – грудні сегменти, 10 – черевні сегменти, 11 – дихальна трубка

Робота 9. Вивчення будови лялечок гедзів

Розгляньте під стереоскопічним мікроскопом «МБС-10» при збільшенні $2\times$ лялечку гедзя. Вона циліндрична, злегка вигнута зі спинного боку. Голова без шипів і різких виступів. Грудний відділ з добре наміченими криловими зачатками і ногами. На спинній стороні грудей біля заднього краю голови розміщується пара великих грудних вушкоподібних стигм. Черевце складається з вісьми сегментів, кожен з яких, окрім першого і останнього, біля заднього краю вкритий густим рядом щетинок або волосків, що створюють безперервне коло навколо кільця. На всіх сегментах, окрім останнього, з боків розташовані добре помітні черевні стигми. Останній сегмент червця короткий, на кінці має шість великих відростків, які утворюють характерну розетку. Форма і розташування цих відростків варіюють у різних видів, і тому будова розетки має систематичне значення (Рис. 9).

Зарисуйте зовнішній вигляд лялечки гедзя та розетку.




Рис. 9. Лялечка гедзя *Tabanus autumnalis*: А – вигляд збоку, Б – вигляд останнього сегменту (розетка)

Рекомендована література

Основна:

1. Зінченко, О. П. Медична та ветеринарна ентомологія : Метод. рек. до викон. лабораторних робіт / О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін.— Луцьк: Медіа, 2018.— 84 с.
2. Козько, В. М. Медична паразитологія з ентомологією. Навчальний посібник для мед. ВНЗ IV р. а. / В. М. Козько, В. В. М'ясоєдова. – К.: Медицина, 2015. – 334 с.
3. Медицинская паразитология: Учебное пособие / Под ред. Н. В.Чебышева. – 2012. – 304 с.
4. Прудкина, Н.С. Кровососущие двукрылые насекомые. Фауна, биология, экология, медико-ветеринарное значение: учеб. пособие / Н. С. Прудкина; Харьк. энтомол. о-во. – Х. : Коллегиум, 2011. – 287 с.
5. Тарасов, В. В. Медицинская энтомология / В. В. Тарасов. – М. : Изд-во МГУ, 1996. – 352 с.

Додаткова:

6. Благовещенский, Д. И. Методы исследования вшей (Siphunculata) / Д. И. Благовещенский. – Л. : Наука, 1972. – 89 с.
7. Бошко, Г. В. Гедзі Diptera, Tabanidae / Г. В. Бошко // Фауна України. – Т. 13, вып. 4. – К. : Наук. думка, 1973. – 207 с.
8. Ващенко, В. С. Блохи (Siphonaptera) – переносчики возбудителей болезней человека и животных / В. С. Ващенко. – Л. : Наука, 1988. – 161 с.
9. Ветеринарная паразитология / [Г. М. Уркхарт, Дж. Эрмур, Дж. Дункан и др.]. – М. : Аквариум ЛТД, 2000. – 352 с.
10. Высоцкая, С. О. Методы сбора и изучения блох и их личинок / С. О. Высоцкая, А. Н. Кирьякова. – Л. : Наука, 1970. – 83 с.
11. Жужиков, Д. П. Тараканы рядом с нами. Определитель / Д. П. Жужиков, Н. А. Алешо. – М. : [б. и.], 1997. – 41 с.
12. Зінченко О.П., Сухомлін К.Б. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: термінологія і номенклатура: У 2-х т. Т. 2. Номенклатура. /

- Українське ентомологічне товариство; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2002. – 428 с.
13. Каплич, В. М. Определитель мошек (Diptera: Simuliidae) Полесья / В.М. Каплич, Е. Б. Сухомлин, А. П. Зинченко. – Минск: Новое знание, 2012. – 477 с.
 14. Каплич, В.М. Мошки (Diptera: Simuliidae) смешанных лесов Европы / В. М. Каплич, Е. Б. Сухомлин, А.П. Зинченко; под общ. ред. В.М. Каплича. – Минск: Новое знание, 2015. – 464 с.– ISBN 978-985-475-782-7.
 15. Кілочницька, Н.П. Короткий визначник кровосисних комарів фауни України / Н. П. Кілочницька. – К.: ООО «Геопринт», 2008. – 90 с.
 16. Кривошеина, М. Г. Определитель семейств и родов палеарктических двукрылых подотряда Nematocera по личинкам / М. Г. Кривошеина. – М.: Т-во научных изданий КМК, 2012. – 244 с.
 17. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: Підручник / [В. Ф. Галат, А. В. Березовський, М. П. Прус, Н. М. Сорока]; ред. В. Ф. Галат. – К. : Вища освіта, 2003. – 464 с.
 18. Поляков, В.А. Ветеринарная энтомология и арахнология. Справочник / В. А. Поляков, У. Я. Узаков, Г. А. Веселкин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 239 с.
 19. Федоренко, І. О. Воші, пухойди. Пухойди-менопоноїди. Ч. 1. Родини сомафантиди, менопоніди, псевдоменопоніди / І. О. Федоренко // Фауна України. – Т. 22, вип. 5. – К. : Наук. думка, 1983. – 168 с.
 20. Федоренко, І. А. Вши, пухоеды. Пухоеды-филоптериды. Ч. 2. Подсемейство филоптерины / І. А. Федоренко // Фауна України. – Т. 22, вип. 9. – К. : Наук. думка, 1987. – 166 с.
 21. Шевченко Г. К. Кровосисні мокреці / Г. К. Шевченко // Фауна України. – Т. 13, вип. 1. – К.: Наук. думка, 1977. – 254 с.
 22. Юркіна, В. І. Блохи / В. І. Юркіна // Фауна України. – Т. 17, вип. 4. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 152 с.

ЗМІСТ

Передмова.....	3
Модуль 1. Загальні питання прикладної ентомології. Синантропи і та ектопаразити.....	4
Лабораторна робота № 1. Огляд отруйних комах.....	4
Лабораторна робота № 2. Особливості будови, біологія і екологія тарганів.....	8
Лабораторна робота № 3. Особливості морфології і біології кровосисних клопів.....	14
Лабораторна робота № 4. Особливості морфології і біології вошей та пухоїдів.....	18
Лабораторна робота № 5. Особливості морфології і біології бліх.....	26
Лабораторна робота № 6. Особливості морфології і біології справжніх, каліфорових і саркофагових мух.....	33
Лабораторна робота № 7. Особливості морфології і біології оводів та кровососок.....	46
Модуль 2. Гнус.....	53
Лабораторна робота № 8. Особливості морфології і біології малярійних комарів.....	53
Лабораторна робота № 9. Особливості морфології і біології немалярійних комарів.....	64
Лабораторна робота № 10. Особливості морфології і біології мокреців та москітів.....	71
Лабораторна робота № 11. Особливості морфології і біології мошок....	79
Лабораторна робота № 12. Особливості морфології і біології гедзів.....	85
Рекомендована література.....	94