

О ПОСТРОЕНИИ РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА, СВЯЗАННОГО С ЛИНЕЙНЫМ УРАВНЕНИЕМ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНОЙ ШВАРЦА

*Г.П. Степанюк (ВГУ имени Леси Украинки, г. Луцк, Украина)
А.В. Чичурин (БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест)*

В работах [1, 2] был приведен метод, позволяющий линейное дифференциальное уравнение четвертого порядка

$$y'''' + p(x)y'''' + q(x)y'' + r(x)y' + s(x)y = 0 \quad (1)$$

с коэффициентами, удовлетворяющими условиям

$$p' + \frac{1}{4}p^2 - \frac{2}{3}q = 0, \quad q' + \frac{1}{4}pq - \frac{3}{2}r = 0, \quad r' + \frac{1}{4}pr - 4s = 0 \quad (2)$$

свести к нелинейному дифференциальному уравнению

$$64i^6 - 560i^3i'^2 - 1275i'^4 + 448i^4i'' + 2040ii'^2i'' + 192i^2i''^2 - 504i'''^3 - 1120i^2i'i^{(3)} + 840i'i''i^{(3)} - 280ii^{(3)2} + (160i^3 - 300i'^2 + 240ii'')i^{(4)} = 0. \quad (3)$$

В работах [2,3] было проведено исследование уравнения (3). Поиск решений в виде ряда Лорана в точке $x_0 = 0$ приводит к тому, что удастся установить следующий факт: уравнение (3) имеет два двухпараметрических семейства решений, содержащих полюс второго порядка вида

$$i(x) = -\frac{4}{x^2} + \frac{a_{-1}}{x} + a_0 - \frac{1}{16}(8a_0a_{-1} + a_{-1}^3)x + \\ + \frac{481a_{-1}^4 + 2464a_{-1}^2a_0 - 4096a_0^2}{25600}x^2 + \frac{12288a_{-1}a_0^2 + 608a_{-1}^3a_0 - 243a_{-1}^5}{102400}x^3 + \\ + \frac{90112a_0^3 - 841a_{-1}^6 - 36136a_{-1}^4a_0 - 164352a_{-1}^2a_0^2}{4096000}x^4 + \dots,$$

где a_{-1}, a_0 – произвольные постоянные;

$$i(x) = -\frac{3}{2x^2} + \frac{a_{-1}}{x} - \frac{1}{2}a_{-1}^2 + a_1x - \frac{113a_{-1}^4 + 954a_{-1}a_1}{3510}x^2 + \\ + \frac{14166a_{-1}^2a_1 - 613a_{-1}^5}{68445}x^3 - \frac{15949a_{-1}^6 + 254484a_{-1}^3a_1 + 1127061a_1^2}{8897850}x^4 + \dots,$$

где a_{-1}, a_1 – произвольные постоянные. Поиск решения в виде ряда Тейлора в точке x_0 приводит к тому, что решение представляется в виде ряда

$$i(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 - (64a_0^6 + 896a_2a_0^4 - 560a_1^2a_0^3 + \\ + 192(4a_2^2 - 35a_1a_3)a_0^2 + 240(17a_1^2a_2 - 42a_3^2)a_0 - \\ 3(425a_1^4 - 3360a_1a_2a_3 + 1344a_3^2))x^4 \times (480(8a_0^3 + 24a_2a_0 - 15a_1^2))^{-1} + \dots \quad (6)$$

$$\begin{aligned}
 \text{или в виде ряда } i(x) = a_0 + a_1x + \left(\frac{5a_1^2}{8a_0} - \frac{1}{3}a_0^2\right)x^2 + \\
 + \left(\frac{5a_1^3}{16a_0^2} - \frac{1}{2}a_0a_1\right)x^3 + \left(\frac{a_0^3}{12} - \frac{7a_1^2}{16} + \frac{35a_1^4}{256a_0^3}\right)x^4 + \dots \quad (7)
 \end{aligned}$$

где a_0, a_1, a_2, a_3 – произвольные постоянные.

Приведем процедуру, позволяющую из разложения (6) получить решение уравнения (3) в замкнутой форме.

Выберем, например, значения параметров a_0, a_1, a_2, a_3 в виде

$$a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{5}, a_3 = 0. \quad (8)$$

Подставляя величины (8) в формулу (6) получим разложение

$$\begin{aligned}
 i(x) = 1 - \frac{x^2}{5} + \frac{17x^4}{500} - \frac{83x^6}{15625} + \frac{983x^8}{1250000} - \frac{17543x^{10}}{156250000} + \frac{48821x^{12}}{3125000000} - \\
 - \frac{83309x^{14}}{39062500000} + \frac{11206399x^{16}}{39062500000000} - \frac{7449433x^{18}}{195312500000000} + \frac{490501621x^{20}}{97656250000000000} - \dots
 \end{aligned}$$

или, его можно переписать в виде

$$i(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{\frac{1}{2}(-1-n)} 5^{-2-n} (7 + 15n + 6^{\frac{1+n}{2}} (23 + 15n)) \text{Sin}\left[\frac{n\pi}{2}\right] x^{n-1}.$$

Последний ряд представляет собой дробно-рациональную функцию вида

$$i(x) = \frac{1250(1250+100x^2+3x^4)}{(1250+175x^2+3x^4)^2}. \quad (9)$$

В том, что функция (9) является решением уравнения (3) легко убедиться непосредственной подстановкой.

Выводы: 1) Найденная функция (9) является решением уравнения (3), содержится в классе функций вида $\frac{P_4(x)}{P_8(x)}$, где $P_4(x), P_8(x)$ – многочлены соответственно четвертой и восьмой степеней с определенными коэффициентами и отлична от найденных ранее решений;

2) предложенный метод позволяет получить другие решения уравнения (3).

Список литературы

1. Лукашевич, Н.А. Дифференциальные уравнения первого порядка / Лукашевич Н.А., Чичурин А.В. – Мн.: БГУ, 1999. – 210 с.
2. Чичурин А.В. Уравнение Шази и линейные уравнения класса Фукса, М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2003. – 163 с.
3. Чичурин А.В. Об одном нелинейном уравнении IV-го порядка с постоянными коэффициентами // Вестник БрГУ. – 2000. - № 4. – С. 33-38.